

外臺秘要

H

Chinese


Vol. IX

9

v. 23 - v. 25

v. 23 - v. 25







尚德接喉  
咽疑當作  
咽喉

唐王燾先生外臺祕要方卷二十三目錄瘰癧咽喉瘰癧二十八門

瘰癧方一十八首

五瘰癧方八首

瘰癧方三首

喉痹方二十一首

喉舌生瘡爛方八首

咽喉腫方五首

懸癰腫方三首

寒熱瘰癧方一十一首

惡核瘰癧方四首

鼠瘻及瘰癧方一十一首

灸瘰癧法六首

諸瘰癧方一十五首

漏液方三首

令人體香方四首

氣瘰癧方一十首

灸瘰癧法一十三首

白瘤及二三十年瘤方三首

咽喉中閉塞方三首

喉咽生瘡方四首

喉卒塞痛及卒毒攻痛方三首

咽喉雜療方四首

瘰癧結核方四首

癰腫瘰癧核不消方五首

毒腫瘰癧方四首


九瘰癧方三十一首

腋臭方三十七首

七孔臭氣方三首

雜療汗出不止方一十首







唐王燾先生外臺秘要方卷二十三

宋朝散大夫守光祿卿直祕閣判登聞鼓院上護軍臣林億等上進

新安後學程行道敬通父訂梓

癰病方一十八首

通按搥搥一本作搥搥病名曰重腿則腿乃虛大之象也尚德按息字上病原

病源癰者由憂患氣結所生亦由飲沙水沙隨氣入於脈搏頸下而成之初作與癰核相似而當頸下也皮寬不急垂搥搥然是也患氣結成癰者但垂核搥搥然無脈也飲沙水成癰者有核癰癰然無根浮動在皮中又云有三種癰有血癰可破之息肉癰可割之有氣癰可具針之養生方云諸山水黑土中出泉流者不可久居常食令人作癰病動氣增患出第三十卷中肘後瘡頸下卒結囊漸大欲成癰海藻酒方 海藻一斤清酒一斗右二味以絹袋盛海藻酒浸春夏二

日一服二合稍稍含咽之日三酒盡更以酒二升清飲之如前滓暴乾末服方寸匕日三盡更作三劑

佳崔氏文仲

又方 昆布海藻等分末之蜜丸合如杏核大含稍稍咽汁日四五並出中卷

深師療癰方 桂心 昆布洗海藻洗甘草炙白麵熟鐵龍膽草 海蛤研土瓜根 半夏洗吳茱萸

牡蠣熟各右十一味為散酢漿水服五分之先食日三十日知盡藥愈節食鹽羊肉錫生葱松菜

又方 海藻二分龍胆草一分昆布二分土瓜根二分半夏二分小麥麵二分右六味為散先食酒服方寸

匕日三二十日知三十日愈忘羊肉錫並出第九卷中

宋本腿字下有真偽反重腿病六字通按其於二字當是甚艱

小品癰病者始作與癰核相似其癰病喜當頸下當中中央不偏兩邊也乃不急腿然則是癰也中國人息氣結癰者但垂腿腿無核也長安及襄陽蠻人其飲沙水喜癰有核癰癰耳無根浮動在皮中其地婦人患之腎氣實沙石性合於腎則令腎實故病癰也北方婦人飲沙水者產乳其於難非針不出是以比家有



通按釋解  
也又漸米  
日釋是浸  
麥令服大  
也

療癭方 小麥升 醇苦酒一升清小麥令釋漉出暴燥復清使苦酒盡暴燥搗篩以海藻三兩別搗

以和麥末令調酒服方寸匕日三禁鹽生魚生菜猪肉時後崔氏備急云療三十年癭疾集驗文仲

集驗療癭酒方 是水雨經露出柳根三十 右以水一斛煮得五升同米三斗釀之酒成先食服一升

日三范汪同出

崔氏海藻散療癭方 海藻八兩洗貝母二兩土瓜根仁小麥麴分 右四味作散酒服方寸匕日三

又方 秫米三升依酒法收 右一味取圓葉白楊皮十兩去上蒼者慎勿令見風細切以水五升煮取二升濃

汁漬麴末五兩用前件秫米依酒法酸之熟訖封塞一七日然後空腹服一大盞日再服三日內即効

神驗無比並出第四卷中

張文仲隱居効驗療癭方 昆布洗 松蘿各三海藻五 右三味搗蜜丸如杏核大含咽津日三夜二

大佳 備急肘後同

又療癭司農楊丞服効第一方 昆布六分海藻以松蘿 乾薑 桂心各四通草五 右六味搗篩蜜

丸如桐子一服吞七丸即住頸下癭處欲至食時即先飲少酒下却九子後進食蘇恭蘇蘇鹽醃臭肉倉

米等若癭大者加藥令多取差

又第二方 昆布洗海藻洗各一斤 右二味細切好酒五升浸七日量力取數服酒盡以酒更浸兩遍葯力

盡當以此酒下前九葯蓋善備急肘後同

又方 小麥三 右以三年米酢三升漬麥暴乾乾更浸使酢盡又暴乾搗篩為散別搗昆布為散每服

取麥散二匕昆布散一匕旦飽食訖清酒和服之若不能飲酒者以水和服亦得服盡即差多服彌善

無所禁但不用舉重及悲啼煩惱等事集驗同

又含丸方 檳榔三馬尾海藻三兩昆布三兩 右三味末之蜜丸如雞子黃大每日空腹含一丸徐徐

令津液取汁咽之忌鹽並楊桑方服驗肘後備急同並出第六卷中



通按細字  
疑誤按細  
即脂細增  
中下指方

救急療癰要切方 鼠粘草根湯洗 右細切除皮者一升一物以水三升煮取一升半分溫三服服相

去姪人行四五里一服宜帳服六劑病即差一方削除皮細切取三大升搗篩為散蜜和丸如梧子一

服二十九日再服之稍稍加至三十九丸以無反酒進之出第五卷中

古今錄驗療氣癰方晉州熙公 姜徐公方 問荆一兩出 海島 羯羊鬐五具去 脂炙 白斂 椒目 甘草炙各一分 小麥麴末二兩

熟 右六味搗篩為散羊鬐一種別搗為末相和好漿浸更搗作丸如小棗大一服五丸無禁

又方 羊鬐一百枚煖湯浸去脂炙大棗二十枚去皮作丸服忌慎如常約法

又方 取羊鬐一具去脂含汁汁盡去皮日一具七日含便差

又療癰海藻散方 海藻洗十分 昆布一兩洗 海蛤研一兩 通草兩 松蘿洗 乾薑 桂心各二 右七味下篩酒

服一錢七日三出第四十一卷中 後無乾薑有白斂

### 氣癰方一十首

廣濟療氣癰氣胸膈滿塞咽喉項頸漸癰昆布丸方 昆布去鹹洗 通草兩 羊鬐二具 海蛤一兩 馬尾海

藻一兩洗 右五味蜜丸如彈子細細含咽汁忌生菜熟麵炙肉蒜笋

又療冷氣築咽喉噎塞癰氣昆布丸方 昆布洗八分 乾薑六分 犀角六分 吳茱萸四分 人參八分 馬尾海藻細

洗 葶藶子六分 杏仁八分去 右八味搗篩蜜丸如梧子空腹以飲服忌生冷粘食陳臭等餘忌同前

又療氣妨塞方 昆布洗三兩 松蘿 通草 柳根鬚各三兩 近 右四味搗篩蜜丸如彈丸大以海藻湯

浸細細含之咽盡勿停忌饗重生噴嚏非等

又療癰細氣方 昆布洗二兩 馬尾海藻十分 杏仁八分 通草 麥門冬去連翹 乾薑 橘皮各六 茯苓

八分 松蘿三兩 右十味搗末以袋盛含之乃以齒微微嚼約袋于汁出入咽中日夜勿停有間荆加四分

佳忌嗔及勞油膩粘食並出第二卷中

深師蘇子膏療氣癰方 臘月猪脂并蘇子 桂心 大黃 當歸 乾薑 橘皮 蜀椒各三 右八



通按括音  
治括取也

味切以水六升煮取二升去滓內猪脂消盡服差忌生葱

出第二十九卷中

崔氏云凡水癭氣癭可差石癭不可治療氣癭方

平旦手挽癭令離項搗其下根服斷愈一日一度搗

易愈者七日如難差者三七日愈

又方

昆布二兩洗海藻二兩洗龍膽草二兩洗馬刀二兩洗海蛤二兩洗大黃二兩洗黃芩二兩洗

右七味搗蜜丸如梧子大

破除日以綿裹一九含咽津朝暮空腹服忌五辛猪肉

又方

海藻二兩洗右一味以酒四升清二宿漉去滓細煖含咽之盡即更造取差為度出第四卷

中

必効主氣癭方

白頭翁半兩洗昆布十分洗海藻七分洗通草一分洗玄參一分洗

連翹八分洗桂心三分洗白斂六分洗右八味搗

篩蜜丸如梧子五九若冷用酒服禁蒜麪猪魚生葱出第五卷中

通按解羅

古今錄驗療癭有在咽喉初起游氣去來陰陽氣相搏遂停住喉中前不去腫起如斛羅諸癭不差小麥

湯方

小麥三升洗昆布三兩洗厚朴二兩洗橘皮二兩洗附子二兩洗海藻二兩洗生薑五兩洗白前三兩洗杏仁一百枚洗

右十味切以水一斗煮取三升半分五服相去一炊頃忌猪肉鵠羊肉冷水出第四卷

五癭方八首

深師五癭丸方

取塵麋以酒漬炙乾再內酒中更浸炙令香咽汁味盡更炙十具愈出金翼同出第

范汪療五癭方

昆布三兩洗海蛤二兩洗松蘿二兩洗海藻三兩洗通草二兩洗白斂二兩洗桂心二兩洗右七味作散酒服

方寸匕日三出金翼同出第

千金療石癭勞癭泥癭憂癭氣癭方

海藻洗龍胆草洗海蛤研通草洗昆布洗礬石燒松蘿洗小麥洗

又方四分半夏洗右九味作散酒服方寸匕日三禁食魚猪肉五辛生菜羊肉鵠十日知二十日愈

又方葛蒲二兩洗海蛤一兩洗白斂一兩洗海藻一兩洗松蘿一兩洗桂心一兩洗椒一兩洗羊脂半兩洗續斷二兩洗神麴三兩洗

桂草一兩洗右十二味搗作散以羊牛髓和為丸如梧子日服三九忌羊肉生葱等同翼

尚德按千金  
金菖蒲一  
兩

鹿  
座宋本作

十二卷中

羅疑是斗



通按到桂  
草聖濟總  
詳作到桂  
為是  
尚德按到  
桂千金作  
到掛到疑  
當作倒  
而德按大  
指千金翼  
作大指

通按千金  
翼相字下  
有當字  
通按大椎  
兩邊去一  
寸半乃大  
杼穴  
尚德按注  
千金作注  
尚德按方  
疑當作法  
下同

又方 小麥麵一特生礬石一斤海藻一斤右三味以陳酢一升漬小麥麵暴乾更漬令酢盡乾各搗

下篩每服兩方寸匕日四五服含乃咽之忌同前及大誦大語吹火用氣並出第二十五卷中

三年本作

千金翼五癭方 海藻洗昆布洗半夏洗細辛 土瓜根 松蘿各一兩白斂 龍胆草各二兩海蛤二兩

通草二兩右十味作散酒服方寸匕日再忘羊肉餘忌同前

又方 昆布洗兩 右二味切如大指酢漬含咽汁盡愈

又方 海藻洗小麥麵一斤右二味以陳酢一升浸麵暴令乾復漬令酢盡作散酒服方寸匕日三忘怒

出第十卷中

灸癭法一十三首

千金灸諸癭法 灸肩髃左右相宛宛中男左十八壯右十七壯女右十八壯左十七壯再三以差止德

按相字下十金有當字

又法 灸風池百壯風池夾項兩邊兩穴兩耳上髮際中通按此條千金翼作灸風池百壯又灸兩耳後髮際百壯乃是兩條然明堂無髮際穴

又法 灸大椎百壯兩邊相去各一寸半小下垂各三十壯

又法 灸頸衝頸衝在伸兩手直向前令臂著頭對鼻所住處灸之各隨年壯凡灸五處九穴翼深師並同通按

即風池髮際大椎大杼頸衝五處共九穴也

又癭上氣并短氣方 灸肺俞一百壯

又癭上氣胸滿法 灸雲門五十壯

又癭惡氣方 灸胸堂百壯

又癭惡氣法 灸天府十五壯

又癭勞氣法 灸衝陽隨年壯在肘外屈橫文頭是按此是曲池穴衝陽在足趾上五寸

灸癭法一十三首



通按明堂  
無天瞿穴

通按中封  
在足內踝

前寸此云  
跗上疑誤

又按前方  
並出千金

第二十八  
卷非二十  
五卷也

著生下束  
本有肉字

夕堂不妄 卷三十一 瘤方三首

又瘰癧法 灸天瞿三百壯橫三間寸灸之高德按瞿疑當作髑千金明堂云天瞿在耳上如前三寸

又瘰癧氣面腫法 灸通天五十壯在耳上二寸

又灸瘰癧法 灸中封隨年壯在兩足跌上曲尺宛宛中並出第二十五卷中

又灸瘰癧法 灸耳後髮際有一陰骨骨間有一小穴亦有動脈準前灸大効 已上穴所在具三十九卷

明堂中出第六卷中

瘤方三首

肘後云皮肉中忽腫起初如梅李漸長大不瘳不痛又不堅強按之柔軟此血瘤也不瘳乃至如盤大則不可復消而非殺人病爾亦慎不可破方乃有大療今如覺但依瘰癧家療瘳若不消更引別大方出中

深師療瘤脂細瘤方 吳茱萸如礬石燒 芎藭 當歸 大黃 黃連 芍藥 白斂 黃芩各二 右

九味合搗下篩和雞子塗著細故熟布上隨瘤大小薄厚貼之燥輒易之著藥當熟作膿脂細細從孔

中出探知膿血盡著生膏若膿不盡復起故也生肉膏方如左

又生肉膏療癰瘤潰漏及金瘡百瘡悉療之方 真當歸 附子 炮甘草 白芷 芎藭 薤白各一 生

地黃三 右七味咬咀以猪膏三升半合微火煮白芷地黃去滓稍以傳瘡上日三良千金並同出第二十九卷中

千金云凡肉瘤勿療瘳則殺人慎之慎之出第二十五卷中

千金翼療瘤病方 麋鹿二種肉割如厚脯火炙令熟搗掩可四灸四易痛膿便愈不除更灸新肉用之

良出第二十四卷中

白瘤及二三十年瘤方三首

千金翼白瘤方 先極搔刮以繩縛之即愈又取東向木空中水熱刮瘤上洗之日三即愈

又方 白礬 硫黃煆 右二味末以酢和封上並出第二十四卷中

千金瘤腫散主二三十年瘤瘰及骨瘤石瘤肉瘤膿瘤血瘤或大如杯孟升斗十年不差致有漏潰令人



尚德按千金骨脂下  
有脂瘤二字  
有或急肉三字  
清作  
又按千金  
翼名臨脈  
鍾乳二分  
又按千金  
尚德按附  
病源作時  
尚德按馬  
根是馬蘭  
尚德按馬  
蘭根瘰癧  
瘰癧口緊  
以為馬蘭  
根者誤

骨消肉盡或堅或軟或清令人驚惕寤寐不安體中掣縮愈而復發療之方千金翼云烏賊魚骨文白

石莖石硫黃紫石英鍾乳三分乾薑兩丹參三琥珀研兩大黃兩附子炮兩胡驚尿兩右十

一味為散貼以韋囊勿令泄氣若瘡濕即傳之若瘡乾無汁者以猪膏和傳日三四以乾為度若汗不

盡者至五劑十劑止勿措意不作也著藥令人不疼痛若不消加芒硝二兩並佳忌猪肉卷中翼無驚

### 喉痹方二十一首

病源喉痹者喉裡腫塞痺痛水漿不得入也人陰陽之氣出於肺循喉嚨而上下也風毒客於喉間氣結

蘊積而生熱故喉腫塞而痺痛脈沉者為陰浮者為陽若右手關上脈陰陽俱實者是喉痺之候也亦令

人壯熱而惡寒七八日不治則死其湯熨針石別有正方補養宣導今附於後養生方導引法云兩手拓

兩頰手不動據肘使急腰內亦然住定放兩肘頭向外附膊腰氣散盡勢大悶始起來去七通去喉痺第

卷中

廣濟療喉痹急痰悶妨不通方 馬蘭根和一升麻三瞿麥兩射干兩犀角二通草兩玄參兩右七

味切以水八升煮取二升去滓細細含咽一日令盡得破膿慎熱麵炙肉蒜

又療喉痹方 馬蘭子和牛蒡子和右二味搗為散每空腹以煖水服方寸匕漸加至一匕半日再吐

卷中

肘後療喉痹者喉裏腫塞痺痛水漿不下入七八日即殺人療之方 巴豆其一枚開 右一味以綿裹極

堅令有繩出外以巴豆內鼻中隨腫左右時時吸氣半日許即差無巴豆用杏仁以塞耳如之文仲范

又方 熱杏仁熟搗蜜丸如彈子含咽其汁亦可搗杏仁末帛裏含之小品文仲備

又方 礬石一兩水三升漬洗手足

又方 生地黄汁二升蜜二升合微火煮之取二升稍稍含之



通按劉蒯  
一作荆蒯

又方 射干 當歸兩三 右二味切以水三升煮取一升稍稍含之吐去更含

又方 劍胡塞耳鼻孔日再易之有效

又方 菖蒲根嚼燒秤銚令赤內一杯酒中沸止飲之文仲備

又療喉痺方 射干一片含咽汁

又方 升麻斷含之喉塞亦然

又方 桔梗三 右一味切以水三升煮取一升頓服之忌猪肉

又方 取芥子搗碎以水及蜜和滓傳喉下燥輒易

又傳用神效方 桔梗 甘草炙 右二味切以水一升煮取服即消有膿即出忌猪肉海藻松菜急

同

又療垂死者方 搗馬蘭根一握少以水絞取汁稍稍咽之口噤以物拗灌之神良

古今錄驗雞子湯療喉痺方 半夏末 右一味開雞子頭去中黃白盛清苦酒令小滿內半夏末 著

中攪令和雞子著刀子鑽令穩炭上令沸葯成置杯中及煖稍咽之袒腫即減忌羊肉此與仲景同

酒湯同半夏不可作末割之可也

又療喉痺塞射干丸方 射干二 豉三 薤白一 杏仁去尖破 犀角一兩 升麻二 甘草一兩 右七味搗下

歸蜜和丸含之稍稍咽津日五六忌海藻松菜

又射干湯療喉痺閉不通利而痛不得飲食者若閉喉并諸疾方 當歸二 升麻一 白芷三 射干 甘草

炙犀角屑 杏仁去尖破 右七味切以水八升煮取一升半分服神良忌海藻松菜出第二十九卷中

近效療喉痺方 大附子一個剉去 右一味以蜜塗火上炙稍熟即含咽汁甜盡又取一片準前含如

已作頭即膿出如未作頭立消神驗忌猪肉冷水

又方 朴硝一兩細細含咽汁一食頃差

宋本無末字



又若腫全盛語聲不出者方 大附子一枚炮裂剉皮去切如豆 右一味含一塊咽汁半食間即差烏頭亦得忌猪  
肉冷水

咽喉中閉塞方三首

廣濟療咽喉中塞鼻中瘡出及乾嘔頭痛食不下方 升麻 通草 黃柏 玄參 絡入 麥門冬 升 附 竹  
筴 前胡 絡 芒硝 右八味切以水八升煮取二升五合去滓內硝溫分三服服別如人食頃自  
利去硝

又方 生雞子一顆開頭取白去黃著米酢拌煇火煇沸起攪下沸定更三度成就熟飲酢盡不過一二  
即差並出第  
二卷中

近效療喉痺咽喉塞喘息不通須臾欲絕神驗方 馬蘭根葉二兩 右一味切以水一大升半煮取一大  
盞去滓細細吃須臾即通絡石草亦療煎法分兩亦同

喉舌生瘡爛方八首

肘後療喉口中及舌生瘡爛方 含好淳苦酒即愈又仲補  
急同

又方 一酒漬藁荷根半日含漱其汁

又方 杏仁二十枚 甘草一分 黃連一分 右三味末綿裹含之千金  
同

又方 礬石去汁 黃連一分 右二味同研內口中令布瘡上

又方 黃連兩 右一味切以水三升煮取一升稍稍含冷吐忌猪肉冷水

張文仲療口中及舌生瘡爛方 取牛膝根酒漬含漱之無酒者但亦取含之肘後  
同

又方 劉黃相含之肘後同並出  
第七卷中

備急療喉中及舌生瘡爛方 劉薑微根濃煮汁含漱之冬用根夏用枝葉文仲肘後同  
出第四卷中

咽喉生瘡方四首

尚德按證  
類無一字  
計字下有  
三  
字  
瘡乃止

通按煇音  
唐煇火也  
煇音都煇  
也熱也一  
作煇字



廣濟療咽中生瘡吐血不下食方方怡雲曰此方余用已驗但不大便宜 生地黃五兩 青竹茹 玄參

雞蘇略二茯芩 升麻 麥門冬三兩 右七味切以水八升煮取二升五合去滓分溫三服服相

去如人行七八里不能多服含細細咽亦得忌生冷熱麵炙肉油酢此第五

千金療口中塞及咽喉不利生瘡口燥膏方 猪膏斤白蜜斤黃連兩 右三味合煮去滓攪令相得含

如半裏日四五度

又療熱病口爛咽喉生瘡水漿不得入膏方 當歸 射干 升麻各一兩 附子半兩 白蜜四兩 右五味切

以猪膏四兩先煮之成膏下著地勿令大熱內諸藥微火煮附子色黃藥成絞去滓內蜜攪上微火煮

令相得盛器中令凝取如杏子大含之日四五度稍稍咽之並出第六卷中

古今錄驗升麻湯療咽喉生瘡方 甘草一兩 升麻 石膏碎 牡丹皮各一兩 右四味切以水七升煮取

三升一服七合日三忌海藻松菜此第二十

咽喉腫方五首

肘後咽喉卒癰腫食飲不過方 用薤一把搗傳腫上冷復易之用苦酒和亦佳范注

又方 吞薤以人子二枚

延年療喉中熱腫方 鼠粘根切一升 右一味以水五升煮取三升去滓分溫三四服忌蒜麵此第十

古今錄驗羚羊角豉湯療喉痛腫結毒氣衝心胸方 豉半升 犀角一兩 羚羊角一兩 芍藥三升 麻四兩 杏

仁一兩 去 梔子一兩 甘草二兩 右八味切以水七升煮取一升半去滓分三服忌海藻松菜

又五香湯療諸惡氣喉腫結核方 沉香二兩 薰陸香二兩 麝香二分 青木香二兩 雞舌香二兩 右五味以水

五升煮取一升半去滓分三服並出第二十九卷中

喉卒塞痛及卒毒攻痛方三首

范汪療卒喉中塞痛不得飲食方 取敗筆一枝燒屑以漿飲服一方寸匕良驗此第十



通按商陸  
石韋柳此  
音陸未知  
是否

尚德按章  
陸即商陸  
日莖子本

草作章陸  
國經本草  
載此方轉  
易作轍易

尚德按千  
金垂作乘  
熟本作上

尚德按千  
金有桂心

尚德按丹  
砂千金作  
丹參

黃宋本作  
無

尚德按李

又仲療喉中卒毒攻痛方

章陸根切炙令熟隔布熨之冷轉易立愈姚云苦酒熟敷傳喉亦療喉痹後用

小品

又方 搗艾傳之並出第  
七卷中

懸癰腫方三首

肘後療懸癰腫卒長數寸如指隨喉出入不得食方 開口捧頭以筋抑舌及燒小鐵於管中灼之令破

灼火畢以鹽隨烙處塗之

又方 搗鹽綿繆筋頭點鹽傳以指之日六七度文仲備  
急同

千金療懸癰垂暴腫長方 乾薑 半夏等分 右二味末之以少少著舌本翼同出第  
六卷中

咽喉雜療方四首

范汪療咽喉不利下氣丸方 射干 附子炮 人參 杏仁炒 右四味合搗下篩蜜丸如梧子含一

丸咽汁日三夜一忌猪肉冷水千金

又療口中咽喉不利當歸丸方 當歸末二兩 杏仁一兩 右二味搗合下篩以蜜和為丸如梧子二丸含漸

漸咽汁日三夜再

又療咽喉中痛不利丸方 升麻 甘草 梔子 射干 丹砂各一兩 雄黃一兩 杏仁一兩 麝香半兩 右八

味搗下篩和以蜜丸如梧子飲服一九日三漸加之酒下亦得咽痛失聲不利用良忌海藻松菜千金

第五十

崔氏療口咽咽內瘡痛欲失聲方 桂心二兩 杏仁一兩 黃芩一兩 右三味搗末合和綿裹含如杏仁許咽

汁消盡更含日三夜二忌臘食出第四  
卷中

寒熱瘰癧方一十一首

病源此由風邪毒氣客於肌肉隨虛處而停結為瘰癧或如梅李等大小兩三相連在皮間而時發寒熱

瘰癧腫方三首

二



字下病源  
有兼校二  
字

之字下宋  
本有不利  
二字

尚德按此  
方與千金

是也久則變膿潰成癰也其湯熨針石別有正方補養宣導今附於後養生方導引法云踞踞以兩手從  
脚入據地曲脚加其上舉尻其可用行氣愈癰瘰乳癰出第三十卷中

甲乙針經寒熱癰瘰論黃帝問曰寒熱癰瘰在於頸腋者皆何氣所生岐伯對曰此皆鼠瘻寒熱之氣也  
稽留於脈而不去者鼠瘻之本皆在於臍其末上出於頸腋之間其浮於脈中未著於肌肉而外為膿血  
者去易問曰去之奈何對曰請從其末引其本可使衰去而絕其寒熱審安其道以予之徐往徐來以去  
之其小如麥者一刺如三刺而已決其生死法反其人目視之其中有赤脈從上下貫瞳子見一脈一歲  
死見一脈半一歲半死見二脈二歲死見三脈三歲死此赤脈不下貫瞳子者可瘳

千金同出  
第八卷中

廣濟療癰瘰九方

鸛骨

狸骨並

射干

玄參

升麻

青木香

沉香

犀角屑

丁香

羚羊角

丹參

甘草

各人參

沙參

各三

獺肝

六連翹

六光明沙

研二分

右十七味

搗篩蜜丸

以飲服十五

九日二服

漸加至三十九

丸空腹服之

忌生

冷油膩血食

並酢熱肉

海藻

松葉

粘食

陳臭生

血物等

又療癰瘰方

連翹

射干

玄參

芍藥

青木香

芒硝

升麻

梔子仁

前胡

當歸

甘草

炙大黃略二

右十二味

切以水一斗

煮取三升

分三服

服別相去如人行六

七里快利忌同前方

第五  
卷中

劉涓子療寒熱癰瘰散方

狸骨並

烏頭並

黃連並

右三味

搗下篩

先食以酒服一錢

七日三良

忌猪肉冷水

說十卷中

千金療癰瘰方

白殭蠶

為散以水服五分

七日三十日差

深師救

又方

於患人背兩邊

腋下後文上隨年壯灸之

又方

灸耳後髮際七壯

又方

櫛白皮斤三

右一味

細切以水七升

煮取三升

去滓

真珠砂方寸匕

和汁一升

旦向日服之

強行



又按珠疑  
常作珠  
通按三朝  
服良四字  
有誤  
尚德按三  
朝服良四  
字無可疑  
各字下末  
本有一字

須臾吐鼠出三朝服良

又方 狸頭一枚炙搗下篩旦白飲服方寸七日再服之

又方 狼糞反封上良

又療寒熱瘰癧散方 連翹 土瓜根 龍胆草 苦參 黃連 桔萸 芍藥 常山皮各狸頭各骨各

又 右九味搗下篩酒服五分七日三忌猪肉冷水翼集驗古今錄驗同一方云無狸頭骨加

救急療瘰癧方 馬齒莧陰乾燒灰臘月猪膏和之以煖泔清洗瘡拭乾傳之日三出第三

瘰癧結核方四首

廣濟療瘰癧食肉結硬薄方 白斂 甘草炙 青木香 芍藥 大黃各三 玄參各三 右六味搗為散少

減以少酢和如稀糊塗故布貼上乾易之勿停忌猪肉五辛熱肉飲酒熱麵等

又瘰癧結核令消散方 黃耆炙 玄參炙 連翹 人參 升麻 青木香 茯苓 蒼耳子 甘草炙 朴

硝 桂心各四 枳實炙 去 大黃 羚羊角屑 麥門冬去心 鼠粘子 苦參各九 右十七味搗蜜丸

如梧子以酒下十九日三夜四漸加至三十九丸以知為度忌同前方並出第五卷中

肘後療頸下生瘡瘰癧如梅李宜使消之方 海藻洗 右一味以酒三升漬數日稍稍飲之文仲備急等同

又方 人參 甘草炙 乾薑 白斂各四 右四味搗篩酒服方寸七日三忌同劉涓子文仲備急同出第六卷中

惡核瘰癧方四首

文仲五香連翹湯療惡肉惡脈惡核瘰癧風結腫氣痛方 青木香 沉香 雞舌香各二 麝香各半 薑

香兩射干 紫葛 升麻 桑寄生 獨活 通草 連翹各二 大黃各三 淡竹瀝各二 右十四味切以

水九升煮取減半內竹瀝更煮取三升分三服忌五辛千金方無紫葛雞舌香有丁香古今錄驗同出第五卷中

延年丹參湯療惡肉核瘰癧諸風氣結聚腫氣諸病並主之方 蒺藜 丹參各二 甘草炙 秦艽 獨活

烏頭炙 牛膝各一 躑躅花 蜀椒各半 右九味切以水八升煮取三升溫服一升忌海藻松采猪肉

瘰癧結核方四首



冷水

古今錄驗有白及餘並同

又玄參湯主惡核瘰癧風結方

玄參

獨活

連翹

木防己

菊花

右六味切以

水八升煮取三分服一升日三服

仲

又丹參膏主惡肉結核瘰癧脈腫氣痛方

丹參

獨活

連翹

白芨

升麻

蒺藜

防己 玄參 杏仁 煅粉

右十味細切以生地黄汁淹漬一宿以鍊成猪膏四升微火煎五上五

下藥成絃去滓以摩病處日三四

癰腫瘰癧核不消方五首

經效犀角丸療瘰癧方

犀角 升麻 大黃 牛蒡子 烏蛇 玄參 右六味末之蜜和丸

如梧子大每日至午後煎牛蒡湯下三十五丸

又方

龍骨 牡蠣

右二味末之酒下三錢七日三度良

又大黃膏方

大黃 附子 細辛 連翹 巴豆 右五味以苦酒浸一宿以臘月猪膏煎三上

三下去滓以綿濾之用傳之日三五度塗之良

集驗療寒熱瘰癧散方

連翹 土灰根 龍胆草 黃連 苦參 枳實 芍藥 右七味為散食

後溫酒下五分七日三

又方

陵鯉甲二十一枚燒搗末傳瘡上效

千金

鼠瘻及瘰癧方一十一首

文仲療瘰癧方

苦參四兩大兩搗末生牛膝和丸如梧子食後煖水下十九日三服

又方

昆布 海藻 右二味各洗去鹹搗末蜜和丸如杏核許大含之日三度良差

救急瘰癧方

取狼鼠不限多少常作羹粥任吃之必驗

千金經

范汪療鼠瘻瘰癧方

取臘月猪膏正月鼠頭燒令作反以膏和傳之愈若不差者瘰癧石炙右肩頭三



通按桂干  
辛溫主欬  
逆下氣不  
主瘰癧此  
用者取其  
辛溫疏散  
通行血脉  
下氣耳即  
白蘇子也  
尚德按慰  
疑當作覺

指度以下指灸姓皆如雞子大良若不能堪者可加中黃亦可已試有良驗

又療頸鼠瘻瘰癧者方 貝母 乾薑 薑本 桂心 蜀椒各一斤 右五味搗下篩先食吳茱萸一分

以酒服一撮忌生葱

又療鼠瘻瘰癧瘻瘻熱方 猪椒二十斤 右一味以水淹足煮熟去滓置瓶中覆瓶口以瘡當上熏候熱極

乃止痛膿血鼠當從瘡出便愈

又寒熱鼠瘻瘰癧瘻瘻散方 狸骨炙 龍骨炙 五躑躅炙 鼠粘子 當歸 王不留行 土瓜根各一斤 右

七味搗合篩先食酒服方寸匕日再夜一並出第四十二卷中

集驗療鼠瘻瘰癧瘻瘻膏方 白馬牛羊猪雞等矢屑各一斤 漏蘆 薑本各一斤 右七味並於石上燒作灰

研絹篩之以猪脂一升三合煎亂髮一兩半令沸髮盡乃內諸藥屑微火上煎五六沸藥成先去瘡上

痂以鹽湯洗新綿拭瘡令燥然後傳膏若無痂猶須湯洗日再若著膏當以帛覆無令風冷神驗瘰癧

以膏傳上亦日再古今錄驗

又療寒熱瘰癧瘻瘻散方 白膏青各半 當歸 防風 桔梗根 芎藭 黃耆 狸骨炙 甘草炙 細辛 乾

薑 露蜂房各一斤 礬石燒半 大附子炮 桂子各半 斑蝥去首足 芫青去首足 右十味六搗下篩為

散以酒服一錢匕日再忌猪肉冷水海藻松菜古今錄驗 汪同

又療鼠瘻方 蛇腹中鼠蝦蟇燒末酒服方寸匕甚效

又方 以檳榔搗末傳腫上熱炒鹽熨之即消良效並出第五卷中

毒腫瘰癧方四首

崔氏大五香湯療毒氣苦肌肉中腫痛結脈寒熱如瘰癧瘻痛不可近急者數日殺人苦心煩悶便當急連

與湯并以滓薄腫脹上方 青木香 雞舌香 沉香 升麻各五 藿香 犀角屑 吳茱萸 桂心 麻

黃 甘草各三 黃蘗香 細辛各二 右十二味以水七升煮取二升分三服不差復合若瘡當惡

小 毒腫瘰癧方四首



寒加附子中形者一枚炮令坼入破用忌生冷菜海藻猪肉冷水生菜五辛古今錄驗同

又五香湯療毒腫瘰癧方 麝香研青木香 雞舌香 藿香 薑蔞香 當歸 黃芩 升麻 芒硝

各三大黃五 右十味咬咀以水六升煮取二升去滓內硝分二服相去如人行七八里再服諸卒口

注惡氣亦療出第五卷中

經心錄射干湯療惡毒身強痛瘰癧方 射干 桂心各二兩 麻黃諸 生薑 甘草各四兩 杏仁四十個 右

六味切以水四升煮取三升去滓分三服忌同前出第五卷中

又升麻湯療風毒咽水不下及瘰癧腫方 升麻 芍藥各四兩 射干 杏仁各三兩 破麻黃 甘草各二兩 楓

香 葛根各三兩 右八味切以水八升煎取半升三服忌同前出第三卷中

灸瘰癧法六首

千金灸瘰癧法 兩腋中患瘰癧處宛宛中百壯上

又法尚德按千金灸漏 搗生章陸根捻作餅子置漏上以艾炷灸餅子上乾熱易之灸三四炷又按千金云灸三四升艾瘰

又法 灸五里大迎各三十壯

又法 萆薢各 豉升 右二味合搗令極熟作餅如大錢厚二分許取一枚當瘡乳上作艾炷如小指大

灸餅上三壯一日易三餅九炷隔三日一灸翼同古今錄驗藥主瘰癧不可灸頭瘡瘰癧氣入腦殺人劉涓子同

又法 一切瘰癧在項上及觸處但有肉結凝以作瘰癧及癰癰者以獨頭蒜截兩頭留心作孔大艾炷

稱蒜大小貼瘰癧上灸之勿令上破肉但取熱而已七炷一易蒜日三易日日灸之取消止同翼

又方 七月七日日未出時取麻花五月五日取艾等分合搗作炷灸瘰癧子一百壯並出第二卷中

九瘰方三十一首

廣濟瘰癧有九種不過此方 芫青四兩 海藻洗昆布洗雄黃研各 狸骨炙三 牡蠣四分 地胆二十 青木香

右八味搗篩為散酒服一錢七日二服病從小便出如爛筋忌生冷粘食猪肉陳臭物出第五卷中

尚德按方  
疑當作注  
又按千金  
灸漏  
尚德按四  
足炭當作  
去足一字  
疑衍

尚德按千  
金云灸兩  
膀裏瘰癧  
處宛宛中  
日一壯上  
日止



通按樓桃  
一作核桃

尚德按錄  
字下疑脫  
驗字

通按樓字  
疑誤

劉涓子療鼠瘻方 死蜚蠊燒作 右一味苦酒和塗之數過即愈先以鹽湯洗古今錄驗

又方 五月五日樓桃搗末先鹽湯洗拭之令乾以末傅瘡上樓桃

又方 烏頭炮附子炮各二兩 右二味咬咀著五升淳苦酒中漬之待乾復內苦酒中燂復內以苦酒盡暴

令乾搗末酒服方寸匕日三忌猪肉冷水等

又張子仁療鼠瘻要方 柞木皮五 右一味以水一斗煮熟去皮煎令汁得二升稍稍服盡當有宿肉

出即愈簡急文仲古今錄

肘後療苦鼻內肉外查瘤瘻並出者是蜂瘻方 取蜂房火炙焦末酒服方寸匕日三

深師療鼠瘻方 鱧鱧魚四野猪皮 瞿麥各一巴豆十五斑猫二十枚五月五日蟾蜍一枚臘月猪

脂分五 右七味搗野猪皮下篩合諸藥更搗下篩內鱧鱧魚以膏和搗千杵平旦未食服如梧桐子二

枚覺者寒熱不覺者復投明日旦起更服三丸稍稍增之慎勿食熱食煩悶殺人虫當從小便出以堪

盛之尿便視乃有百數耳不可以見亦大便出此方驗忘猪肉麋骨等

又方 馬齒莖石燒珍珠粉 右二味搗下篩為散厚塗瘡上不過三愈

又方 松脂 硫黃 狼毒各二猪腦具白斂二 右五味熬猪腦取汁狼毒白斂咬咀以水三升煮取

一升內腦汁中煎令得五合細末硫黃松脂下篩內中攪令相得綿裹內瘡中七日知一七日病除神

良

集驗凡有九種瘻

一曰狼瘻始發於頸頭腫有根起於缺盆上轉連耳本種大此得之因憂憂氣上不得下其根在肺空青

主之商陸為佐

二曰鼠瘻始發於頸無頭尾如鱗鼠瘻核時上時下使人寒熱脫肉此得之由食大鼠餘毒不去其根在

胃狸骨主之知母為佐



三曰螻蛄瘰始發於頸項狀如螻蛄腫潰連生瘡其汁赤黃得之食瓜螻蛄餘毒及果實不去核其根在大腸在子主之桔梗為佐

四曰蜂瘰始發於頸瘰癧三四處俱腫起相連潰潰移此得之多飲流水水有蜂餘毒不去其根在脾雄黃主之黃芩為佐

通按此蜂音度浮大蟻也

五曰蚘蟬瘰始發於頸初得之如傷寒此得之因飲食中有蚘蟬毒不去其根在腎鑿石主之防風為佐六曰蟬蟬瘰始發於頸上下無頭尾如棗核塊塊多在皮中使人寒熱心痛滿此因喜怒哭泣得之其根在心鑿石主之白朮為佐

通按千金瘰作沮後方同

七曰浮沮瘰始發於頸如兩指使人寒熱欲臥此得之因思慮憂憶其根在胆地膽主之甘草為佐八曰瘰癧瘰始發於頸有根初苦痛瘰癧覺之使人寒熱得之新沐頭濕結髮汗流入於頸所致其根在腎雌黃主之芍藥為佐

九曰轉脈瘰始發於頸如大豆浮在脈中濯濯脈轉苦驚湯身如振寒熱始得之時驚臥失枕其根在小腸斑猶主之白芷為佐

瘰癧九種方 空青研錄 商陸根 狸骨炙 知母 荏子 桔梗 雄黃 黃芩 礬石燒 防風 鑿石

燒汁地胆煮 白朮 甘草炙 雌黃 芍藥 斑猶去足 白芷各二 右十八味搗其論病者特加其分

餘種令分等細篩末空青最在後內之苦酒服一刀圭日三服三十日知五十日愈七十日平復病者百日禁食魚肉忌生菜桃李雀肉海藻松菜犬肉生血物餘二大豆為一刀圭小兒服之半大人全服

八歲以下甯從少起過度令人淋淋即滅之

卷中九

千金問曰何謂九瘰答曰一曰狼瘰二曰鼠瘰三曰蟬蟬瘰四曰蜂瘰五曰蚘蟬瘰六曰蟬蟬瘰七曰浮沮瘰八曰瘰癧瘰九曰轉脈瘰謂之九瘰

又瘰癧瘰發於頸頭腫有根起於缺盆上轉連延耳根腫大此得之因憂慮氣上不得下其根在肺空青



腫無頭  
又按千金  
芎藭半斤  
女婦草作  
婦人蔞草  
蜀椒三十  
粒有商陸  
一分為十  
六味  
高德按大  
鼠餘千金  
作有鼠  
又按千金  
有狸骨知  
母為八味

高德按千  
金芎藭一  
分龍骨注  
子各半兩  
高德按千  
金芎藭一  
分龍骨注  
子各半兩  
高德按千  
金芎藭一  
分龍骨注  
子各半兩  
高德按千  
金芎藭一  
分龍骨注  
子各半兩

主之商陸為佐方 空青研分 蝟腦二分 獨活一分 蠅肝乾之 芎藭半兩 女婦草一分 黃芩 鼈甲炙 斑猫去翅

乾薑 當歸 茴香 礬石燒 地膽各一 蜀椒三升 右十五味作散下篩酒服方寸匕日三十五日

即止忌生血物莧菜劉涓子古 今錄驗同

又瘡鼠瘻發於頸無頭尾如雞鼠使人寒熱此得之因食大鼠餘毒不去其根在胃狸骨主之知母為佐

方 陵鯉甲炙 山龜殼炙 甘草炙 桂心 雄黃 乾薑等 右六味作散下篩服方寸匕日三蜜和內瘡

中無不愈先炙作瘡後與藥良忌海藻生葱劉涓子備急古 今錄驗文仲同

又瘡鼠瘻瘡差復發及不愈出膿血不止方 以不中水猪脂咬咀生地黃內脂中令其指與地黃足相

淹和煎六七沸去滓桑灰汁淨洗瘡去惡汁以地黃膏塗上日一易范注

又瘡鼠瘻方 得蛇虺所吞口中鼠燒末服方寸匕日再不過三服此大驗但難遇耳并傳瘡中范注

又瘡鼠瘻方 死鼠一枚中形亂髮一枚 右二物以臘月猪膏令淹鼠髮煎之令其鼠髮都盡消膏

成分作二分一分稍稍塗瘡一分以酒服之即愈矣鼠子當從瘡出神良秘不傳翼簡急文仲 集驗范注同

又瘡蜈蚣瘻發於頸項狀如蜈蚣腫潰連生瘻其汁赤黃此得之食瓜蜈蚣餘毒及果實不去核其根在

大腸荏子主之桔梗為佐方 桂心 乾薑 桔梗 礬石燒 獨活各一 附子炮 椒一分 荏子一分 龍骨

半荏子一分 右十味搗下篩蜜二十枚合搗以酢漿丸如大豆溫漿下五九劉涓子同

又方 檉葉皮先以泔清煮檉葉取汁洗拭乾內反瘡中

又瘡蜂瘻發於頸瘻應三四處俱腫起相連潰清移此得之飲流水有蜂毒不去其根在脾雄黃主之黃

芩為佐方 蜂房一具 鼈甲炙 茴香一分 吳茱萸二枚 椒一百粒 汗乾薑一分 右六味擣下篩作散傳瘡孔中日

十度日止忌莧菜

又瘡蜂瘻初生時狀如桃而癢搔之則引大如雞子如覆手者方 熬鹽熨之三宿四日不差至百日成

瘻其狀大如四五寸又廣三寸中生蜂作孔乃有數首治法以石硫黃隨多少然燭燒令汁出著瘡孔



尚德按千金防風各一  
分爲十七  
味  
又按古字  
下疑脫今  
尚德按塊  
多千金作  
累移  
又按千金  
白木礬石  
空青各二  
分細辛一  
兩蠟肉作  
蠟之下  
服之生家  
本有忌生  
菜桃李痘  
肉生血物  
等十一字  
通按此方  
千金有甘  
草一分共  
十味  
尚德按十  
金礬石一  
分虎指作  
虎腎  
三字下宋  
本有忌猪  
肉冷水生  
葱生菜生  
血物無虞  
酢物十六

中須使皮中見蜂數十唯蜂蓋即差

又療此蜂癰發於頸初得如傷寒此因食中有此蜂毒不去其根在腎營石主之防風為佐方 白木加

知母 雌黃 乾地黄 獨活 青黛 斑貓註首用 白芷 柏脂 芍藥 海藻海云當歸各一蠟

皮四分 椒一百粒 桃白皮一分正 右十五味搗下篩作散服一錢匕日三劉涓子古

又療蟻螫癰發於頸無頭尾如裏核塊塊多在皮中使人寒熱心痛滿此因喜怒哭泣其根在心礬石主

之白木為佐方 白木分 礬石分 空青分 當歸分 細辛分 蟬肉分 枸杞根 斑貓去翅 地胆去翅 乾烏

腦豆大 右十味搗下篩散服方寸匕日三醉漿服之病在上側卧在下高枕卧使藥流下 劉涓子古

七日浮沮癰發於頸如兩指使人寒熱欲卧得之因思慮憂憶其根在膽地膽主之甘草為佐方 雄黃

分一 乾薑分 膽龍二分 石決明 續斷 菴蘭根各三 細辛分 大黃半 地胆黃以下六 味并地胆各三

分 右九味搗下篩為散傳瘡日四五忌生菜劉涓子同古今錄驗

又療瘰癧癰發於頸有根初苦痛歷歷覺之使人寒熱此得之新沐頭濕髻髮汗流入於頸其根在腎雌

黃主之芍藥為佐方 茯苓 續斷 礬石燒令乾薑 雌黃 芍藥 桔梗 椒汗 乾地黄 常山

空青 狸肉 烏腦壯腎 斑貓各一分 附子炮 礬石半 虎指各一分 右十七味搗篩為

散蜜丸如大豆夜酒服十九日三古今錄

又療轉脈癰發於頸如大豆浮在脈中濯濯脈轉苦驚惕身如振寒熱得之於驚卧失枕其根在小腸斑

貓主之白芷為佐方 綠青分 礬石半 分燒 防風分 甘草半 分 大黃 桂心 人參 當歸各二升 麻分

地膽熱 白木分 鍾乳研 斑貓翅一分 白芷 續斷 麝香各一分 麥門冬去心 右十七味搗下篩

蜜丸酒服如大豆十九日三勿食倉米慎房百日劉涓子古今錄驗同

崔氏療九種癰方 芫青二十枚 地胆十枚 斑貓三十枚 生犀如棗核 豉四十粒 大豆黃一百枚 牛黃

大 蜈蚣一枚 肥大者 折取 右八味搗篩蜜丸如梧子初欲服藥少夜食明旦飲服二丸須臾可煮



字  
尚德按倉

米十金作

本有忌海

李在肉生

葱十一字

服字下宋

本有忌猪

肉冷水五

字

尚德按蜂

字下疑脫

房字

良字下宋

本有忌生

葱海松

菜七字

通按背一

作眉

先宋本作

洗

疑錯簡

酢漿薄粥稍稍冷飲之其瘰癧有形狀皆從小便出至日西甚虛悶可煮湯食薑黃黃薑食之其餘

脂膩醋脯一切口味五辛果子之類並不得食人強隔日一服人弱兩三日一服服藥以瘰癧盡為

度若差仍作二十日許將息藥欲盡豫合勿使斷絕藥氣不能將息便不須服救急千金同

張文仲療鼠瘻方 石南 生地黃 雌黃 茯苓 黃連各二 右五味作散傳瘡日再同備急

又療鼠瘻諸惡瘡方 苦參 三露蜂 兩 麴 右三味以水三斗漬藥三宿去滓黍米二升釀熟飲日三

一方得蠅皮一具劉涓子同並

備急劉涓子鼠瘻方 山龜殼 桂心 雄黃 乾薑 狸骨 甘草 右六味等分搗篩為散飲服

方寸匕日三蜜和內瘡中無不愈先灸作瘡後與藥良

又方 礬石三分 斑猫一分去首 右二味搗下篩用酢漿服半匕須臾瘰癧從小便出刪繁文仲同

古今錄驗療鼠瘻麝香塗方 麝香 雌黃各研 右二味等分並為散取蝦蟇背白汁和塗瘡孔中日一

度

又療鼠瘻著頭生小者如杏大者如杯方 斑猫一分去首 牡蠣二分 海藻四分先 右三味搗下篩酒

服五分匕日三病當從小便出如魚胞忌蒜並出第四

諸瘻方一十五首

劉涓子瘰癧病方 斑猫四十枚去 桂心四分 芫青十枚去 葛上亭長三十枚 右四味搗下篩酒服半錢匕

日一忌生葱

又療瘻方 斑猫四十枚去 地膽三十枚去 蜥蜴三枚 右三味搗之千杵蜜和如大豆服二丸

又療瘻眾方不差效驗方 牡蒙兩 右一味搗之湯和適寒溫取一升許薄瘡上冷易經宿佳

又療瘻生肉膏方 桑新皮三升水四升淋之復重淋之取三升石反熬令黃內灰汁中以兩重帛裏縫

去滓更魚目煎取二升勿用急火煎隨瘻孔深淺初時作服散而差孔若深四寸新藥與孔裏雜白使

通按此條  
疑錯簡  
集驗凡有九種瘻  
十一



通按蛭一作蟻

尚德按各字疑行蛇疑當作蛇

通按脫一作灸

尚德按證類引肘後

濡安藥薤白入藥孔裏若深四寸隨瘻根而灸兩處每處與四十壯唯勿灸瘻孔隨深淺去膿散與膏安著瘡孔裏十五過少遲延日月取差肉滿膿亦斷神良無比出第六卷中

肘後論此本在諸方瘡條中病類既多今狀出為別一篇凡瘻病有鼠蛇蜂蛙蚓類似而小異皆從飲食中得其精氣入人肌體變化成形瘡既穿潰浸諸經脈則亦殺人而鼠蟻最多以其間近人故也

通治諸瘻方 以八月中多取斑猫蟲即內苦酒中半日許出暴乾使十取六七枚著銅器中微火上逆熬令熟搗作屑巴豆一粒去皮熬之又拔取黃犬背上毛二七枚亦熬作屑好朱以錢五分已都合和以苦酒頓服之蟲當盡出若一服未效先時可預作三兩劑後日服達不過三兩劑通按朱

又方 虎薊根 杜衡 枳根 酸棗根各一 斑猫一枚方云三 猫薊根各一 右六味搗蜜丸日一服如棗一枚以小丸著瘡中

又方 若先著下部邊或上出耳後頸項諸處者苦參切五升以苦酒一斗漬三四日宜服一升亦加之但多作以知為度不過三四度必差

又瘻瘻方 槲木皮長一尺闊六寸去黑皮細切以水一斗煮取五升去滓內白糖十挺煎取一升分三服以銅器接吐出看視之

又方 新生兒矢一百日以來皆收置密器中五六十日取塗瘡孔中

又方 鯉魚腸切作五段火上脫之洗瘡拭乾以腸封之冷即易自晷至旦乾止覺瘻開看虫出差崔氏瘻瘻方 槲白皮五升 右一味以水八升煮令泣泣絞去滓重煎令成膏日服半棗漸加至一棗

許亦著瘡上無患瘡唯宜煮飯首指鹽又不得多食之出第五卷中 備急瘻瘻生肉膏方 棟白皮二鼠肉二兩 薤白三當歸四兩 生地黄五兩 右五味以臘月猪膏三升煎薤白

黃色膏成傳瘡孔上令生肉肘後文 又葛氏云苦著口裏方 棟木東引根切 右一味水煮取濃汁含之數吐勿咽肘後同並出第五卷中



苦著二字  
作瘰者  
三字

生字下宋  
本有忌雜  
諸魚蒜房  
室七字

机字下宋  
本有思晉  
切少獸也  
六字

尚德按年  
字下千金  
有醋字

又按傳之  
下千金有  
欲傳取脂  
卧時六字  
尚德按千  
金當歸半  
兩  
又按千金  
無靜字及  
第一二字

備急療諸瘰方

取葶藶子搗細羅取好白蜜和丸每欲著先溫泔洗者瘰孔中以丸內之若塞以物

道開日三度瘡痛是差候勿停藥大效

出第五卷中

必效療諸瘰方

先以泔清溫洗以綿拭之取葵葉微火煖貼之引膿不過三二百葉膿盡出即肉生王

丞頻用大奇效

腋臭方三十七首

病源人腋下臭如葱豉之氣者亦言如狐狸之氣者故謂之狐臭此皆血氣不和總積故氣臭出於三十  
肘後瘰人體及腋下狀如狐机氣世謂之胡臭方 炊甌飯及熟丸以拭腋下臭仍與犬食之七日一如

此即差文仲備

又方 煮雞子兩枚熟去殼及熟各內腋下冷棄之三路口勿反顧三為之文仲備

又方 燒好礬石末絹囊盛之常以粉腋下不過十度小品集驗文

又方 青木香二附子白灰煨石白灰一兩右四味細末著粉腋下汗出因以粉之亦差

又方 青木香斤石灰斤右二味常以粉身亦差並搗末傳之

又方 乾薑 胡粉 白灰等右三味合作末粉之范汪同並出

千金瘰胡臭漏腋有天生胡臭有為人所染臭者天生者難療為人所染者易差然須三年傳白礬散勿

止并服五香丸乃可得差勿言一度傳約即差止可傳約時暫得一度差耳凡胡臭人通忌食薑薑五辛

瘰之終身不差胡臭方 辛夷 芎藭 細辛 杜蘅 藁木各三右五味咬咀以苦酒漬之一宿煎

三日取汁傳以差為度

五香丸主口臭及身臭止腫痛散血氣方 豆蔻子 丁香 藿香 白芷 青木香 當歸 桂心

零陵香略 甘松香仁 香附子二 檳榔枚 右十一味搗下篩蜜丸如大豆日三夜一時含之咽津五

日內口香十日身香二七日衣被香三十七日下風人聞香四七日靜洗手水落地香五七日把他人手



尚德按十  
金無四指  
之四字

尚德按十  
金附子白  
友青木香  
各二兩  
石半兩

亦香禁五辛下氣去臭第一

出第六卷中

又石灰散主胡臭方

青木香 楓香

丁香 薑陸香

各二兩

錫起石

橘皮

各三兩

礬石

燒四兩

石灰

一升

右八味搗下篩以綿作篆字粗如四指長四寸展取藥著上即以絹囊盛之繫著臂先以布拭指令痛

然後夾之

又方

水銀胡粉面脂研和傅之大驗

救急同

又方

辛夷 細辛 芎藭

青木香

右四味等分搗下篩作散重塗粉之

又方

伏龍肝作泥傅之良

又方

牛脂和胡粉三合煎令可丸塗腋下宿即愈

集驗同

又方

三年苦酒和石灰傅之

又方

赤銅屑以酢和銀器中炒極熱以布裹慰腋下冷復易差止

又方

附子炮石反

熟

青木香

三兩

礬石

燒

米粉

升

右五味搗篩常粉之

又方

馬齒草一束

右一味搗碎以蜜和作團以紙裹之以泥糊紙厚半寸暴乾以火燒熟破取更以

少許蜜和使熱勿令冷

先以生布指之夾藥腋下痛久忍不能得然後以手中勒兩臂差

出第二十卷中

崔氏療胡臭有效方

先用泔清淨洗又用清酢漿水淨洗訖微揩使破取銅屑和醃酢熱指之不過三

四度差

又方

胡粉

銅青

右二味等分研以人乳和塗腋下若成瘡且停瘡差又塗以差為度

出第四卷中

張文仲療胡臭若股內陰下常汗濕且臭或作瘡者方

但以胡粉一物粉之即差常用大驗

備急同

又隱居效驗胡臭方

雞古香

藿香

青木香

胡粉

各二兩

右四味搗散作粉綿裹內腋下常傅即

差

備急同出第七卷

救急療腋臭方

銅屑升石灰

三升

右二味合和囊盛粉之有汗便粉之



通按酢一作酥

燂指音炙又也

尚德按裏疑當作裏

又方 甘草<sup>炙</sup> 松根白皮 甘瓜子 大棗<sup>各四</sup> 右四味為散食後服方寸匕日三<sup>出第三卷中</sup>

又方 雞矢 白礬石<sup>數合</sup> 黃礬<sup>熟</sup> 附子<sup>炮</sup> 木蘭皮 青木香<sup>各一兩</sup> 右六味搗為散粉之又石龍衣一

大雨蛇蛻皮是也以子日夜半燒為灰服之

又方 常以鹽綠和醃酢塗之一遍一年再塗永除以胡粉和水銀和令相入塗腋下十日以來無氣<sup>出第八卷中</sup>

又方 黃礬 細辛 芎藭<sup>各二兩</sup> 雄黃<sup>兩</sup> 右四味搗下篩為散先以泔清洗腋拭去毛令血出以粉腋

必致瘰癧臭方 好礬砂<sup>二兩</sup> 好白礬<sup>熟</sup> 蜜陀僧<sup>各三兩</sup> 酢酪<sup>二兩</sup> 胡粉<sup>仁</sup> 金屑<sup>八兩</sup> 鈇錫 生銅屑<sup>各二兩</sup> 右八

味並研令細酢一升新銅器中盛藥蜜封其口二七日看上青綠色鬱鬱然其藥即成還須研令極細

至用時若乾更以好酢和藥以塗病處若有毛先拔去以石灰水淨洗拭使乾以生布揩令微赤可作

瘡一日一塗洗遠不過十日即待腋瘡差訖更取銅屑細研成粉粉病處日五六即止病差終身不得

帶麝香食胡荽

又方 取五月五日承露百草陰乾火燒為灰用井華水和灰為團重火鍊如燂灰色鍊訖即以醃酢和

為餅厚如掌大小徑二寸以來即於兩腋下挾即易夾時一身連頭並悶二日後若病不差復著藥微

發亦不甚臭還依法療之永斷

又金錯屑塗法 金錯屑<sup>銖</sup> 銀錯屑 赤銅屑 香附子 胡粉 錢錯屑<sup>各一兩</sup> 三年醋<sup>升三</sup> 右七味以

羊酪一升於銅器中煮得二沸以用塗之

又方 三年醃酢<sup>升</sup> 碎銅屑<sup>鹽</sup> 灰<sup>合</sup> 右四味浸藥攪藥色青即塗腋下日三四塗三日小愈一月全

差

又方大銅錢<sup>文</sup> 白梅<sup>個</sup> 鹽<sup>升</sup> 右三味以五月五日水一升共置瓶子裡挂戶上百日畢可取用塗



不得婦人為塗藥食粘食蒜發

又方 以酢五合內銅器中以錢十四文胡粉五銖置中泥頭七日後以粉十銖和之訖去腋下毛日再傳之合藥勿令人見秘之

又方 以首子男兒乳汁浸鹽研銅青拔去毛使血出塗差

又方 醃醋浸青木香置腋下夾之即愈

又方 錢三文胡粉三馬齒草三青木香二大酢升 右五味切先以醋漬錢五六日然後總漬諸藥

一物煮五六沸置瑱器中先以石反汁洗病處拭乾訖塗之以差為度並出第三卷中

古今錄驗療胡臭青羊脂粉方 胡粉 銅青等 右二味先以鹽湯洗兩腋下及著藥且淋洗又以青

羊脂和傳數日差

又錢汁傳方 錢二文 右以礪石磨令平以夾腋下神良並出第三十卷中

漏腋方三首

病源腋下常濕仍臭生瘡謂之漏腋此亦是氣血不和為風邪所搏津液蘊於故令濕臭出第三十卷中

集驗療漏腋腋下及足心手掌陰下股裏常如汗濕致臭六物胡粉傳方 乾枸杞根兩胡粉 乾商陸

根 滑石各一兩 乾薑微根甘草半兩 右藥搗下篩以苦酒和塗腋下當微汗出易衣復塗著藥不

過三傳便愈或更發復塗之不可多傳傷人腋餘處亦塗之小品文仲備急集驗小同出第九卷中

經心錄漏腋方 正朝旦以小便洗文仲備急集驗小同出第九卷中

又方 搗馬齒草腋下夾之令燥復易之先用雌黃石灰等分合水煎一兩沸如泥泥之毛落然後塗諸

藥良並出第五卷中

七孔臭氣方三首

千金療面目口齒七孔臭方 沉香五甘草二兩 白瓜瓣半升芎藭半升丁香五藿香一麝香各二兩 當歸各二兩



尚德按肘  
後無甘草

尚德按傷  
寒論大寒  
十二枚  
一升下家  
本有忌指  
肉冷水溫  
藻松葉生  
蔥十一字

右八味搗下篩蜜丸食後含如小豆五粒日三秘不傳久服令人舉體皆香救急同出  
第六卷中

救急療人七孔臭氣方 甘草五分芎藭四分白芷三分 右三味作散下篩食後飲服方寸匕日三

又方 瓜子仁一分芎藭 藁本 當歸 杜衡各一細辛一分防風一分 右七味搗下篩食後溫水服方寸

匕日三

令人體香方四首

肘後令人體香方 白芷 藁本 杜若 杜衡 藁本等 右五味末之蜜和旦服如梧子三丸晷服

四九三十日足下悉香文仲備急  
范汪同

又方 甘草炙 瓜子 大棗 松根皮等 右四味搗下篩食後服方寸匕日三二十日覺效五十日身

體並香百日衣服牀幃悉香文仲備急  
范汪同

又方 瓜子仁 芎藭 藁本 當歸 杜衡 細辛各二分 白芷 桂心各五分 甘草二分 右九味搗下

篩食後服方寸匕日三五日口香二十日肉香文仲備急  
出第五卷中

千金療諸身體臭方 竹葉兩桃白皮兩 右二味以水一石二斗煮取五斗浴即香出第六  
卷中

雜療汗出不止方

集驗療止汗粉藥方 牡蠣二兩附子半兩麻黃根二兩 右三味搗篩以白粉一升和合粉汗汗止忌猪

肉

又汗後遂漏不止其人惡風小便難四肢微急難以屈伸桂枝加附子湯方 大棗十三枚附子一枚桂

芍藥 生薑各三兩甘草二兩 右六味切以水七升煮取三升溫服一升延年同此本張  
仲景傷寒論方

千金止汗方 青松葉斤 右一味搗令汁出清酒一升漬二宿近火一宿初服半升漸至一升頭面浮

即止出第八  
卷中

延年澤瀉湯療大虛煩躁止汗治氣方 澤瀉 茯苓各二兩牡蠣炙白朮各一兩生薑半斤 右五味切以水



八升煮取二升分服一升日再服

又都梁散療汗出如水及汗出衄血吐血小便血殆死方

都梁香二兩紫莞

人參 青竹茹

茯苓各

兩乾地黄二兩熱

右六味搗下篩水服方寸匕不效須臾再服忌蕪荑

又療大病之後虛汗不可止方

杜仲

牡蠣等分

右二味搗下篩向暮臥以水服一錢七午前汗止

者不再服服之令人乾燥若汗不止者復服一錢不過再必愈有驗天行及百病後虛吸漏汗遂溫之

無不止者

又療大病後虛汗出不禁者方

棗粉

豉等分

故竹扇如手掌大燒取反

右三味合搗以絹囊盛粉體立止

最驗當先熬末粉之並千金

又粉散療大病後身體虛腫汗出止汗方

麻黃根三兩

乾薑

細辛各二

白斂兩

右五味合下

篩以棗粉五升熬令黃合和以粉身出第十二卷中也

古今錄驗療汗出不止木桂散方

麻黃

桂心各五

白朮

附子炮

右五味搗末酒服方

寸匕日三未食服

又止汗熱雷丸散方

雷丸

桂心

牡蠣各五

右三味搗下篩粉身日三

出第二十卷中

通按溫一作服



尚德按疽  
字下疑脫  
方字  
尚德按癰  
癰發當作  
尚德按四  
首疑當作  
四十一首

唐王燾先生外臺祕要方卷二十四目錄癰疽發背九門

癰疽一十四首

石癰方五首

附骨疽方八首

緩疽方四首

癰疽發背雜療方二十六首

癰腫方二十五首

癰癰方一十四首

癰疽方一十六首

發背方四首又按今有方二十九首







唐王壽先生外臺秘要方卷二十四

宋朝散大夫守光祿卿直祕閣判登聞鼓院上護軍臣林億等上進

新安後學程行道敬通父訂梓

癰疽方一十四首

集驗癰疽論黃帝曰夫子言癰疽何以別之岐伯答曰榮衛稽留於經脈之中則血泣而不行不行則衛氣從之從之而不通壅遏不得行故熱大熱不止熱勝則肉腐肉腐則為膿然不能陷肌膚於骨髓骨髓不為焦枯五臟不為傷故命曰癰黃帝曰何謂疽岐伯答曰熱氣純盛下陷肌膚骨髓骨肉內連五臟血氣竭盡當其癰下筋骨良肉皆無餘故名曰疽疽者其上皮天瘡以堅亦如牛領之皮癰者其上皮薄以澤此其候黃帝曰善

出太素第  
十六卷中

經言五藏不調致疽六腑不和生癰一曰爛疽急者二三日殺人緩者十餘日殺人二曰癰疽急者十餘日殺人緩者一月死三日緩疽急者一年殺人緩者數年四曰水疽所發多在手足數年猶可療疽者數十種要如此于氏法癰之疾所發緩地不殺人所發若在險地宜令即外消若至小膿猶可療大膿致禍矣

一為腦戶 二為古本 三為玄癰 四為喉節 五為胡脈

六為五藏俞 七為五藏繫 八為兩乳 九為心鳩尾 十為兩手魚

十一為腸屈之間十二為小道之後 十三為九孔 十四為兩脇腸 十五為神主之舍

一本云主  
客之舍

凡十五處不可傷而況於癰乎若癰發此地遇良醫能不及大膿者可救至大膿害及矣范注

候賊風證但夜痛應骨不可按抑不得迴轉痛處不壯熱體亦不乍寒乍熱但覺體疼癢然冷欲得熱熱

慰痛處即小寬時有汗此是賊風證也宜即得針灸服療風藥溫也方在療風候上大  
法宜知二候如此也

通按癰疽  
一本作癰  
索尚德按慰



疑當作髮

近按腦稟  
辨二音

外臺秘要卷二十四

又初得附骨疽即服漏蘆湯下之傳小豆薄得消也

又下利已腫處未消者可除大黃用生地黃及乾地黄隨時也熱漸退餘風未歇者可服五香連翹湯除大黃餘熱未消可傳生麻膏佳若失時不消成膿者用火針膏散如療癰法又有偏疾喜著四肢其狀赤脈起如編繩急痛壯熱其發於脚者喜從蹠蹠起至踝赤如編繩謂之偏病也

又其發於臂者喜腋下起至掌也皆由四肢勞熱氣盛為涼濕所折風結筋中成此疾也不即療取消潰去膿則筋攣縮也其若但置不消復不潰其熱歇氣不散喜變作腦也

又療之宜服漏蘆湯令下外以鋒針針去血氣針瀉上結脈處傳小豆薄則消也皆可依療丹法消之及潰成膿出火針傳膏散如療癰法也

又亦用甘蕉根薄之差

又癰發腫高者病源淺腫下者病源深大熱者易療小熱者難療初便大痛傷肌晚乃大痛傷骨都堅者未有膿半堅半軟者有膿發腫都軟血癰也非癰發腫以漸知長引日月亦不大熱時時牽痛癰也非癰吳音曰謂諸氣結亦有腫久久不消成癰療之宜散氣氣已散若初腫處有浮氣年衰皆發癰療之宜及年盛並折散熱可無此憂

于氏法夫癰疽脈洪羸難療脈微濡者易療諸浮數之脈應當發熱而反惡寒者癰也此或附骨以有膿也

趙乃言無虛勞腹中疾或發血癰瘡瘡狀墳起頭墨正爾置不當灸療瘡之火熨便焦爛剝去焦痂則血泄不可禁必死癰起於節解遇頑醫不能即消令至大膿者豈膏藥可得復生乎

又發癰堅如石走皮中無根瘰癧也久不消因得他熱之疾時有發為癰也

又發癰至堅而有根者名為石癰療之法當服酒非酒即藥勢不宣但當稍飲取令相得和散便止凡癰腫有肥人用貼宜枯萁根和平體宜赤小豆貼方以赤小豆五合內苦酒中熬之畢搗為散以苦酒和



通接發於  
股肱靈樞  
作發於股  
脛名曰股  
脛疽  
尚德按室  
樞政營作  
敗疵連作  
通接發於  
靈樞作疵  
此至服散  
當以酒疑  
脫簡

之塗拭紙上貼腫從發腫兩頭以下

范注

又論少小有渴年四十以外多發癰疽有膈疾而渴者年盛必作黃疸年衰必發癰疽也

范注

又黃帝曰願聞癰疽之形與其期日岐伯曰略說癰疽之極者十八種

又癰疽發咽名曰猛疽猛疽不療則血化為膿膿不為塞咽半日死其化膿者為已則含豕膏無冷食三日而已一去無食

又發於股肱名曰股脫疽其狀不甚變而癰腫膿搏骨不急療三十日死

詳內曰股肱外曰髀膝上股下骨稱曰股肱也

又發於脇名曰改訾改訾者女子之疾也久之其狀大癰膿其中乃有生肉大如赤小豆療之方

劉連

翹草及根各一升以水一斗六升煮令竭取三升即強飲厚衣坐釜上令汗出至足已

又發於尻者名曰銳疽其狀赤堅大急療之不療三十日死

又發於脛者名曰兔齧其狀赤至骨急療之不療害人

又發於足上下者名曰四淫其狀大如癰不急療百日死

又發於肩及臑者名曰疵疽其狀赤黑急療之此令人汗出至足不害五藏癰發四五日逆滿之

尚德按

上矣百壯石子當碎出也不出可益壯

從癰發高下以微范注並同

又石癰者始發皮核相親者不赤頭不甚堅微痛執執漸自歇便堅如石故謂之石癰難消又不可得自

孰縱愈皆百餘日也又發癰兩頭牽而傍推無根者又不痛結筋非癰也發癰狀如蛇雖極大此肉瘤非

癰也腫一寸至三寸痛也三寸至五寸癰也五寸至一尺癰疽也一尺至三尺名曰竟體疽腫成膿大孔

皆出諸氣憤鬱不遂志欲者多發此疾癰及疽血瘤鼠乳石癰結筋癰癰皆不可就針角針角少不及禍

者

凡癰疽之疾未見膿易療之當上矣三百壯四邊間子灸谷二百壯實者可下之虛者可補之有氣者下



其氣服占斯內塞散得愈絕房三年凡癰瘡審知膿者破之皆當近下邊膿出後當膏藥允之常使開潤勿令燥合也若其人羸勿一頓盡膿徐徐令後稍出乃盡癰方潰其上皮薄人喜當上破之此終不愈當下破之乃得膿且勿要其皮厚也凡癰有膿當破無膿但氣腫若有血慎不可破針灸也按之四邊堅中軟此為有膿滿也一邊軟亦有膿都堅者此為疽核或但有氣也都軟者此為有血血瘤也當審堅軟虛實為要若堅疽積久後若更變熱偏有軟處不可破者疽當暖裏置耳若多刺破療必暴劇不可救及結筋腫肉鼠乳皆不當療也又服內塞散不與他療相害晝夜十餘度服散當以酒

又發於腋下堅赤者名曰米疽療之用砭石欲細而長疎啟之塗以豕膏六日已勿裏其癰堅而不潰者為馬刀挾纓急療之太素經曰頸前已纓尚

又發於股陰者名曰赤弛不急療六日死在兩股之內不可療一云六十日死

又發於膝者名曰疵疽其狀大癰色不變寒熱如堅石勿石石之死須其赤色異乃石之者生冷石熨之

又諸癰腫之發於節而相應者不可療太素經云膈入節門故不可療也

又發於陽者百日死

又發於陰者三十日死太素經曰陽婦人陰器曰陰

又發於踝者名曰走緩其狀肉色不變數石其輸而止其寒熱不死

又發於足傍者名曰厲疽其狀不大初從小指發急療之去其黑者不消輒益不療百日死云足側也

又發於胸者名曰背疽狀如大豆三四日起不早療下入腹人腹不療十日死太素經云寒熱

又發於足指者名曰脫疽其狀赤黑死不療不赤黑可療療不哀急斬去之得活不去者死靈樞按疽

又發於膚者名曰舌疽其狀如穀實赤莖常苦寒熱急療之去其寒熱不療十歲死死後出膿

尚德按施  
靈樞作施  
尚德按施  
靈樞作施

通按初從  
靈樞作初  
如

又按背疽  
靈樞作并  
疽

通按發於  
膚靈樞作



於膚古疽  
作耳疽  
尚德按項  
日之曰字

疑行  
尚德按背  
千金作背

尚德按大  
千金作大

尚德按千  
金云便住  
藥以謂無  
效即稿至  
矣

尚德按蜂  
千金作蜂

尚德按此  
方令見千  
金藥青小  
豆作小豆

又發於頸者名曰天疽其狀大而赤黑不急療則熱氣下入淵腋前傷任脈內熏肝肺十餘日死太素經  
前日一云發頸以前十八種並  
千金論曰夫癰疽初發人皆不以為急此實奇患唯宜速療若瘡不速病成難救以此致禍者不一發皆

外皮薄為癰皮厚為疽宜急治之夫癰壞後有惡肉者以豬蹄湯洗去穢次傅食肉膏散惡肉盡傅生肉  
膏散及摩四邊令善肉連生當斷絕房室慎風冷勞煩待筋脈平復乃可任意耳不爾新肉易傷傷則重  
潰發發則禍至慎之慎之

凡癰疽始發或似小癰或復大痛或復小痛或發如米粒大白膿子此皆微候宜速療之見有少異即須  
大驚忙須急治之及斷口味速服諸湯下去熱毒若無醫藥即灸當頭百壯其大重者灸四面及頭上二  
三百壯壯數不慮多也復薄冷藥貼膏種種救療交差也

又其用藥貼法皆須當瘡中處開孔口令洩瘡熱氣出亦當頭以大針針入四分即差

身中忽有痛處似打狀名曰氣痛痛不可忍遊走不住發作有時痛則小熱痛定則寒此皆由冬受溫風  
至春暴寒風來折之不成溫病乃作氣痛也又宜先服五香連翹湯摩丹參膏又以白酒煮楊柳皮及煖  
熨之有赤氣點點刺出血也其連翹湯可服數劑及竹瀝湯勿以一劑未效便謂即止遂不服耳中間將  
白薇散佳

素問曰寒氣客於經絡血凝滲澀不行擁結為癰疽也不言熱之作也其後成癰又陽氣湊集寒化為熱  
熱盛則肉腐為膿也又以酢和蜂蟻屎塗之乾即易差即止

凡腫根廣一寸以下名癰一寸以上名小癰如豆粒大者名胞子皆始作急服五香連翹湯下之數劑取  
差止並出第二  
十三卷中

廣濟癰疽排膿散方 黃耆十分 靑小豆一分 乾薑一分 芍藥三分 肉桂三分 白斂三分 有膿 桔葉三分

便利倍甘草三分 右七味為散酒服方寸匕日三服不利忌海藻松菜熱麵魚蒜等千金同一方

外臺必要 卷二十四 癰疽方一十四首



又療癰疽排膿散方 人參 當歸 桂心略 芍藥 厚朴 炙甘草略 防風 白芷略 桔梗兩

右九味搗篩為散以酒服方寸匕日二服不利若瘡未合常服之忌生冷粘菜海藻生葱蒜並出第

劉涓子癰疽先宜傳大黃食肉膏方在發背部千金方食惡肉散後用大黃附子等十物者乃是皮兒

膏方 當歸 芍藥 白芷略 烏頭兩 巴豆兩 松脂兩 猪肪兩 三七味咬咀內膏中微火合煎

三沸已內松脂攪令相得以綿布絞去滓以膏著綿絮兒頭大瘡雖深兒之膿自出就克盡即生善肉

瘡淺者不足克著瘡中日三惡肉盡即止

又療癰疽發壞出血生肉黃耆膏方 黃耆 芍藥 當歸 大黃 芍藥 獨活 白芷 薤白 生

地黃略 右九味切猪膏二升半煎三上三下膏成絞去滓傳克瘡中摩左右日三文仲同並出

又療癰疽瘡生肉黃耆膏方 黃耆 細辛 生地黃 蜀椒 當歸 芍藥 薤白 白芷 芍藥

丹參略 猪膏一升半 臘月者甘草 薤白 獨活 黃芩略 右十五味以苦酒一升二合夏月漬一宿

冬月二宿微火煎三沸煮酒氣盡成傳之

又療癰疽始作便壞熱毒發瘡膏方 羊髓兩 甘草兩 胡粉五分 大黃兩 猪膏兩 仁

煎二味煑內甘草大黃三上三下絞去滓內胡粉絞令調和傳瘡上日五度

又療癰疽已潰白芷麻膏方 白芷 甘草略 烏頭兩 薤白十五 青竹茹一握 右五味切以猪膏

一升合煎白芷黃耆成絞去滓塗瘡四邊勿著瘡中並出第

深師內塞散癰疽潰漏血脈空竭方 黃耆 細辛 芍藥 薤白 仁 白芷 瞿麥略 赤小豆兩

乾地黃 人參 防風略 右十味切先以新成白苦酒置新器中內赤小豆須尖出銅器中熬令

燥復須內苦酒中更熬凡五反止合搗為散酒服方寸匕日夜六七過腹痛甚倍芍藥口未開倍薤白

仁膿多倍黃耆出第二十

刪繁癰疽等毒潰爛猪蹄洗湯方 猪蹄一具 如食法 薤白根斤 甘草炙 芍藥 白芷略 五 右五味切以



尚德按千金翼野葛皮一兩龍骨二兩云隋濟國黎所名神散

水二斗煮猪蹄取八升去滓下諸藥煮取四升稍稍洗瘡

出第九卷中

千金翼黃帝問曰有疽死者奈何歧伯曰身有五部伏菟一脰二膊三背五藏之膺四項五五部有疽死也

附藥同本出靈樞

又王不留行散主癰疽及諸癰腫潰腐服之亦瘳癰腫不潰苦因無賴方野葛皮野葛皮五色龍骨王不留行

留行子二升千金方用合翼云一升桂心兩當歸兩乾薑兩一括萎合六右七味為散食訖溫酒服方寸匕日二以四

肢習習為度不知漸漸加之此浩仲堪方隨日濟國黎施行實為神散癰腫即消此方妙千金同出第

癰腫方二十五首

集驗瘡癰腫大按乃痛者病深小按便痛者病淺按之處陷不復者無膿按之即復者有膿若當上破者

膿出不盡不盡稍深蝕骨骨碎出當以魚導側際從下頭破令膿出盡出盡則骨生愈矣若惡肉不盡者

食惡肉藥去之膏塗之即愈食肉藥方取白荻灰水淋以煎令如膏此不宜預作作之十日則敗并可

以去黑子黑子藥注便即拭去不時拭則傷膚又一方以桑皮灰亦妙

凡破諸病肉厚處當先廣封四面不爾瘡披裂氣泄便死不可救也以補有久癰餘瘡為敗癰深疽有

脛間喜生瘡中外惡瘡霜寒凍不差經年或骨疽亦名脛瘡深爛青黑四邊堅強中央膿血惡汁出百藥

瘳不差汁漬好肉處皆腫亦有碎骨從中出者可溫赤龍皮湯洗之夏月日日洗之冬日三日四日一洗

潰肉多者可時敷白蘭茹散食去之可一日之中三四敷之止後長數家猪屎散得差也取猪矢燒作

灰下絹篩以粉疽敗瘡中令滿汁出脫去便敷之長敷須差也若更生青肉復著白蘭茹微如前法也

出第八卷中

千金翼凡五子日夜半五丑日鷄鳴五寅日平旦五卯日日出五辰日食時五巳日禺中

五午日日中五未日日昃五申日晡時五酉日日入五戌日黃昏五亥日人定右以此

日時遇疾發者皆不起也

出第二十卷中



尚德按唐本草云十月上亥日取猪膽入瓦器中理灰池百名脂膏  
尚德按千金翼錄無丹砂

廣濟療癰腫潰內服藥外宜貼膏方 松脂一斤 脂生三合 椒葉一兩 白蠟三蛇銜 黃耆 芍藥 白芷 當歸 細辛 芍藥各一 右十一味切以水先煎脂蠟并盡內諸藥三上三下白芷色黃膏成

用剪故帛可瘡大小塗膏貼上日夜各一

又療癰腫膿潰瘡中有紫肉硬不消以此散兌頭內蝕之方 石硫黃一分 馬齒礬石二分 熟漆頭一分 熟三麝香研 雄黃各二分 雌黃一分 白礬二分 熟丹砂二分 右八味搗篩為散攪令調熟以敷瘡中瘡惡

肉上貼膏日二易千金并翼錄同並出第三十卷中

劉涓子療癰腫方 白斂 烏頭炮 黃芩各等分 右三味搗下篩和雞子白敷上即愈出第十卷中

療癰腫有熱黃耆貼方數用神驗 甘草炙 大黃 白斂 黃耆 芍藥 右五味各等分搗篩以雞子

黃和如濁泥塗布上隨赤熱有堅處大小貼之燥易甚效

刪繁療癰腫白斂薄貼方 白斂 當歸 芍藥 大黃 莽草 芍藥 右六味各等分搗篩下雞子

黃和如泥塗布隨大小貼之燥易

又療癰腫堅核不消白斂貼之方 白斂 大黃 赤石脂 芍藥 莽草 黃芩 黃連 茱萸 右

八味各等分搗篩以雞子黃和如濁泥塗布上隨核大小貼之燥易

又療癰腫黃耆貼之方通按腫一作瘡 黃耆一兩 黃芩 芍藥各一 黃連 白芷 芍藥各二分 當歸一兩 右

七味搗篩以雞子白和如膏諸暴腫起處以塗著布上已貼燥易腫處不覺貼冷便愈熱勢毒者加白

斂一兩尤佳

又療癰腫黃耆貼方 黃耆 大黃 白芷 牡蠣熬 白斂 右五味各等分搗篩和雞子貼燥易

又療癰腫已潰四物黃連薄貼方 黃連 黃柏 地榆 白芷各二分 右藥搗篩雞子白和塗布薄貼

癰上對瘡口穿布出癰氣令疎氣

又療癰腫一物枯薑薄貼方 以枯薑根隨多少止一物切五片內苦酒中熬燥搗篩之苦酒和塗紙上



尚德按千  
金當歸以  
下八味各  
一兩腹作  
猪

尚德按千  
金治氣腫  
痛

尚德按千  
金四味各  
三分  
又按千金  
乾即易之

尚德按千  
金翼黃者  
以下五味  
各三兩芳  
藥黃各各  
一兩

尚德按千  
金翼黃逐  
合二字

以貼癰腫上服散人宜用

並出第  
九卷中

千金瘰癧腫松脂貼方

當歸

黃耆

黃連

芍藥

蠟

黃芩

芎藭

大黃

各四兩  
細切

松脂

一斤

脂半合

右十味切以微火煎之三上三下綿布絞去滓向火炙令生牋紙上隨大小貼之一日三度

易之即差

又療腫瘰癧散方

瘰癧子

一升煮  
令黃

右一味搗篩以麻油和之如泥炒令焦黑以塗故布上剪如腫大

勿開頭搗上無瘰癧子用

小豆和雞子

如前乾則易之甚妙

又搗湯方

大黃

黃芩

白斂

芒硝

右四味以水六升煮取三升以故帛四重內汁中以搗

腫上煖復易晝夜為之

同翼

又癰腫痛煩固方

以生揪葉十重貼之以布綿裹緩急得所日二易止痛消腫食膿血良無比勝於衆

貼冬以先收乾者臨時鹽湯沃潤用之亦可薄削上皮用之

備急張文  
仲附後同

又諸癰腫牢堅諸藥不療方

削附子如碁子厚一指正著腫上以少唾濕附子火炙附子令熟微附子

欲乾輒令更唾濕之常令附子熱氣入腫中無不愈者此法絕妙

並出第  
十三卷中

千金翼黃耆湯主癰腫熱盛口乾除熱止渴方

黃耆

升麻

桔葉

乾地黄

麥門冬

法芍藥

各

兩

黃芩

枳實

右八味切以水一斗煮取三升分三服

劉涓子用升麻一兩  
枳實十四枚餘藥同

又白斂薄貼主癰腫方

白斂

大黃

黃芩

右三味搗篩和雞子白如泥塗布上薄貼腫上乾

則易之可以三指撮藥末內三升水中煮三沸綿注汁拭腫上數十遍以寒水石末和塗腫上以紙覆

之乾則易之一易輒以煮汁拭之日夜三十度

劉涓子  
同

又療癰腫方

伏龍肝

以酢和作泥塗布上貼之乾則易之消矣

又凡腫已潰未潰者方

以膠一片水漬令軟納納然稱腫之大小貼當頭上開孔若已潰遂合者膿當

被膠急撮之膿皆出盡未有膿者腫當自消矣

被膠急撮之膿皆出盡未有膿者腫當自消矣

以膠一片水漬令軟納納然稱腫之大小貼當頭上開孔若已潰遂合者膿當

被膠急撮之膿皆出盡未有膿者腫當自消矣

以膠一片水漬令軟納納然稱腫之大小貼當頭上開孔若已潰遂合者膿當

被膠急撮之膿皆出盡未有膿者腫當自消矣

以膠一片水漬令軟納納然稱腫之大小貼當頭上開孔若已潰遂合者膿當

被膠急撮之膿皆出盡未有膿者腫當自消矣

以膠一片水漬令軟納納然稱腫之大小貼當頭上開孔若已潰遂合者膿當

被膠急撮之膿皆出盡未有膿者腫當自消矣

以膠一片水漬令軟納納然稱腫之大小貼當頭上開孔若已潰遂合者膿當

被膠急撮之膿皆出盡未有膿者腫當自消矣

以膠一片水漬令軟納納然稱腫之大小貼當頭上開孔若已潰遂合者膿當

被膠急撮之膿皆出盡未有膿者腫當自消矣

被膠急撮之膿皆出盡未有膿者腫當自消矣

以膠一片水漬令軟納納然稱腫之大小貼當頭上開孔若已潰遂合者膿當

被膠急撮之膿皆出盡未有膿者腫當自消矣

以膠一片水漬令軟納納然稱腫之大小貼當頭上開孔若已潰遂合者膿當

被膠急撮之膿皆出盡未有膿者腫當自消矣

以膠一片水漬令軟納納然稱腫之大小貼當頭上開孔若已潰遂合者膿當

被膠急撮之膿皆出盡未有膿者腫當自消矣

以膠一片水漬令軟納納然稱腫之大小貼當頭上開孔若已潰遂合者膿當

被膠急撮之膿皆出盡未有膿者腫當自消矣

以膠一片水漬令軟納納然稱腫之大小貼當頭上開孔若已潰遂合者膿當

被膠急撮之膿皆出盡未有膿者腫當自消矣

以膠一片水漬令軟納納然稱腫之大小貼當頭上開孔若已潰遂合者膿當

被膠急撮之膿皆出盡未有膿者腫當自消矣

被膠急撮之膿皆出盡未有膿者腫當自消矣

以膠一片水漬令軟納納然稱腫之大小貼當頭上開孔若已潰遂合者膿當

被膠急撮之膿皆出盡未有膿者腫當自消矣

以膠一片水漬令軟納納然稱腫之大小貼當頭上開孔若已潰遂合者膿當

被膠急撮之膿皆出盡未有膿者腫當自消矣

以膠一片水漬令軟納納然稱腫之大小貼當頭上開孔若已潰遂合者膿當

被膠急撮之膿皆出盡未有膿者腫當自消矣

以膠一片水漬令軟納納然稱腫之大小貼當頭上開孔若已潰遂合者膿當

被膠急撮之膿皆出盡未有膿者腫當自消矣

以膠一片水漬令軟納納然稱腫之大小貼當頭上開孔若已潰遂合者膿當

被膠急撮之膿皆出盡未有膿者腫當自消矣

以膠一片水漬令軟納納然稱腫之大小貼當頭上開孔若已潰遂合者膿當

被膠急撮之膿皆出盡未有膿者腫當自消矣

被膠急撮之膿皆出盡未有膿者腫當自消矣

以膠一片水漬令軟納納然稱腫之大小貼當頭上開孔若已潰遂合者膿當

被膠急撮之膿皆出盡未有膿者腫當自消矣

以膠一片水漬令軟納納然稱腫之大小貼當頭上開孔若已潰遂合者膿當

被膠急撮之膿皆出盡未有膿者腫當自消矣

以膠一片水漬令軟納納然稱腫之大小貼當頭上開孔若已潰遂合者膿當

被膠急撮之膿皆出盡未有膿者腫當自消矣

以膠一片水漬令軟納納然稱腫之大小貼當頭上開孔若已潰遂合者膿當

被膠急撮之膿皆出盡未有膿者腫當自消矣

以膠一片水漬令軟納納然稱腫之大小貼當頭上開孔若已潰遂合者膿當

被膠急撮之膿皆出盡未有膿者腫當自消矣

以膠一片水漬令軟納納然稱腫之大小貼當頭上開孔若已潰遂合者膿當

被膠急撮之膿皆出盡未有膿者腫當自消矣

被膠急撮之膿皆出盡未有膿者腫當自消矣



尚德按千金翼卷取三升

高德按腦千金作濕

又方 燒鯉魚作灰酢和塗之一切腫上以為差度至良

又溫中湯主癰腫取冷過多寒中下利食完出方 甘草炙乾薑 附子各六分蜀椒二百四十枚右四味切

以水六升煮取二升分三服忌海藻菘菜豬肉冷水劉涓子同出第

張文仲劉涓子療癰消腫木占斯散方 木占斯 桂心 人參 細辛 敗醬 乾薑 厚朴炙甘草

防風 桔梗 栝蒌略一 右十一味搗為散服方寸匕八咽覺流入瘡中若癰及疽灸亦不能發壞

者可服之瘡未壞者去敗醬已壞發膿者內敗醬此藥時有化癰疽令成水為妙

隱居必效方消癰腫 白欬分二藜蘆分一 右二味搗為末以苦酒和如泥貼腫上日三大良備急同出第五卷中

石癰方五首

千金堅如石核復大色不變或作石癰療之鍊石散方 鹿角八兩一作白反白欬三兩麝理黃石一斤酢五升先

中復燒內之 右三味搗篩作細末以餘醋拌和如泥厚塗之乾即塗取消止盡更合諸漏瘰癧藥悉

皆主之並須火鍼瘡上塗膏

又方 單鹿角半更塗不如上方佳也集驗文仲小品古今醫驗同

又療石癰堅如石不作服方 以生商陸根爛搗敷之燥則易又治腦漏及諸癰癰古今醫驗同

又方 以蜀桑根白皮陰乾搗末消膠以酒和敷上即拔出並出第二十三卷中

備急療若發腫至堅而有根者名曰石癰也方 灸腫三百壯當石子破碎出如不出益壯乃出其癰疽

石壅結筋癭癰皆不可鍼角殺人集驗文仲千金同出第四卷中

癰疽方一十四首

劉涓子療癰癰諸腫有熱方 地黃細切 右一味以水一斗煮取三升去滓煎湯令小厚以塗紙當

瘡中央貼之日再三易數用大良并瘰牛領上腫出第十卷中

集驗瘰癧及癰如結實赤熱者方 以水磨半更塗之燥復更塗得流便消也出草中可自掘生半反乃



佳此療神驗勿不信也

出第八卷中

千金療九癰無頭者方 吞葵子一枚即出勿多服頭多也

又方 燒葛蔓灰封上自消

又方 牛糞封之佳

又方 以鼠粘葉貼之

又方 用水和雀糞敷之

又方 狗頭骨 芸薹子 右二味等分為末和酥封之

又療癰潰後膿不斷及諸物刺傷不差方 取石硫黃三兩粉之一味筋一片礮頭令碎少濕之內石

硫黃中刺瘡孔以瘡差為度

通按諸字可疑

又乾地黃九圭虛熱消瘡癰方 乾地黃四兩黃四兩桂心二兩芍藥 茯苓各三兩王不留行 黃芩 麥門

冬心遠志 升麻 人參 甘草 枳實各二兩 右十三味搗篩蜜和丸如梧子大酒服十九日三加

至二十九長服令人肥健

同翼

又地黃煎方補虛除熱可將和服取利也散石癰疽癰痔熱悉宜服百日癰疽永不發也 取生地黃隨

多少三搗三押取汁令盡一味以新布重絞其汁澄清置銅器中湯上焦之減半復下更新布絞去麤

碎結濁者滓攪盡復煎之濃竭令如飴糖置磁器中酒服如彈丸大日三勿加至百日服之有驗

又梔子湯主表裏俱熱三焦不實身體生瘡或發癰癰大小便不利方 芒硝二兩大黃四兩梔子七枚黃芩

知母 甘草各二兩 右六味切以水五升煮減半下大黃煮取一升八合去滓內芒硝二兩分三服忌

海藻松菜

並出第一十三卷中又按一疑當作二

千金翼論曰一切癰疽皆是瘡痕根本所患癰之微膿汁不止得冷即是鼠癰是以漏方次之大須急救

之 馬齒草五升柳白皮一斤水五升煮麝香半兩乾之杏仁半升油煎令

切

取一升

煮清

麝香仍研作末

杏仁黑痔如膏

右四味以磁器貼之合和

尚德按千金  
金梔子二  
十枚黃芩  
如母甘草  
各三兩  
尚德按振  
千金翼作  
又按千金

尚德按用  
筋以點藥  
諸筋皆得  
無可疑  
尚德按十  
金桂心及  
王不留行  
以下八味  
各三兩



翼煉作帛  
淨洗試乾  
剪五字作  
前減半洗  
四字

尚德按十  
金故作破  
勝作勝  
中絕字下  
有手字肥  
洪洪作肌  
洪洪作金  
若作看有  
洪洪作有  
崩洪作成  
作或

尚德按及  
千金作成  
又按千金  
擬下膏方  
併用  
尚德按十

外臺秘要卷二十四

以三四重綿蜜繫口病已成瘡者以泔清淨洗拭乾剪作貼子塗藥貼著瘡上日三易若未作瘡如作瘰癧子者以艾一升熏黃如棗大乾漆如棗大木之釜月下土三味並木和艾作炷灸三七壯本方瘰癧出

第三十

又主癰腫方 生椒末麴末釜月下土末之以大酢和敷之並出第二十四卷中

附骨疽方八首

千金診附骨疽法凡附骨疽者無故附骨成膿故名附骨疽蓋著大節解中丈夫產婦喜著勝髀嬰兒亦著脊背丈夫急者先覺痛不得動搖按之應骨痛經日便覺皮肉漸急洪腫如肥狀是也小兒纔近便大啼呼即是肢節有痛候也大人緩者先覺肥洪洪然經日便覺癢痛不隨小兒四肢不能動搖亦如不隨狀著肢節解中有洪洪處不知是附骨疽令遍身成腫不至潰死體皆青黯大人亦有不別是附骨疽呼為賊風風腫也

又凡人身體患熱當風取涼風入骨解中風熱相搏便成附骨疽其候嗜眠沈重忽忽耳鳴又秋夏露臥為冷所折風熱伏結而作此疾急者熱多風少緩者風多熱少小兒未知取風冷何意而有此疾由其血氣盛肌嫩漸為風冷折之即腰理凝結故也

又凡骨疽者久瘡不差差而復發骨從孔中出名為骨疽方 以豬膽和楸葉搗封之

又方 搗白楊葉下篩敷之

又方 穿地作坑口小裏大深三尺取乾雞屎五升以艾及荊葉和之令可燃火令煙出內疽孔坑中以

衣擁坑口勿洩煙半日許當有蟲出

又癰疽敗及骨疽方 末龍骨粉瘡四面厚二分

又方 用自死蝦蟆一枚頭髮一把以豬膏一斤半內二物煎之消盡下之欲冷內鹽一合攪和以膏著

瘡中日一易蟲出如髮蟲盡愈



金猪膏一

又骨疽百方療不差方 可瘡上以艾炙之三日三夜無不愈也並出第二十三卷中

其小蟲出更洗更敷蟲出盡止備急文仲同

又瘡疽瘡骨出方 黃連 牡蠣各二 右二味末先以鹽湯洗以粉之文仲同出第四卷中

瘡疽方一十六首

集驗論胸中痛少氣急入間中以手掩左眼竟視右眼見光者胸中結癰也若不見光瘡疽內發若吐膿血此不療之疾宜以灰掩膿血上不爾者傷人也又齒間臭熱血出是瘡疽也七日死療所不差宜以灰掩地血瘡疽喜者指與代指相似人不別者亦呼作代指不急瘡其毒逐脉上入藏殺人南方人得此疾皆斬去指恐其毒上攻藏故瘡疽者指頭者其先作黯泡然後腫赤黑黯疼痛人心是也出第八卷中

尚德按千金暗黯作黯熟揭作揭合作令勢作熱

尚德按侵發當作浸

千金瘡疽論說曰瘡疽者肉中忽生點子如豆粒小者如黍粟劇者如梅李或赤黑青白不定一種其狀有根不浮腫痛癢癰心根深至肌少久便四面悉腫飽黯黯紫黑色能爛壞筋骨也毒散逐脉入藏殺人南方人名為揭著毒著厚肉處即割去之亦燒鐵烙炮上合焦如炭亦炮上灸百壯為佳單橫酸草葉敷腫四面防其長大飲葵根汁及藍青汁若犀角汁升麻汁竹瀝汁黃龍湯諸單療折其勢耳其病亦喜著指故與代指相似人不識之呼作代指不急瘡之亦逐脉上入五藏殺人南方人得之皆斬去指疽著指初指頭先作黯泡然後腫赤黑黯疼痛人心是也後有惡肉病者身上忽有肉如赤豆粒突出便長推出如牛馬乳上如雞冠狀不療自長出不止不痛瘡此由春冬時受惡風入肌脈中變成此疾療之宜服漏蘆湯外燒燂日為之令焦盡竟以升麻膏敷之積日乃差備急同出第十三卷中

劉涓子瘡癰疽侵淫廣大羊髓膏方 羊髓 大黃 甘草 胡粉各二 右四味咬咀以豬膏二升半

合煎微火三上三下絞去滓數日四五藥師云兼療赤黑爛壞成瘡出第五卷中

千金瘡癰疽著手足肩背累累如米起色白刮之汁出愈復發方 黃耆 欬冬 花二升 麻分四 附子 炮若







尚德按瘡  
疑當作瘡  
又按侵十  
金作浸  
尚德按十  
金最優作  
浸六未各  
一兩以水  
六升煮

尚德按肉  
疑當作肉

又瘡癰疽侵淫多汁日就浸大胡粉散方

胡粉二分

黃連三分甘草

蘭如各二

右四味下篩以粉瘡

上日三

並文仲備急深師同  
並出第二十三卷中

千金翼薄榆湯主瘡疽侵淫欲作未成或如桃李核或如雞子赤斑方

甘草炙黃芩

大黃

黃連

當歸

芒硝各一

右六味切以水一斗煮取三升絞去滓鑊中下芒硝一沸攪之貼布帛中以搗腫

上數百遍

劉涓子深師同出  
第二十三卷中

緩疽方四首

集驗論有緩疽者初結腫形似癰回無頭尾其色不黑但痛深有根核又與皮肉相親著外耳一名內  
癰其有大者如拳小者如桃李狀積日不消喜變紫色黯黑久即皮內俱爛如牛領瘡狀便通體遍青黯  
色而不作頭穿潰出膿初作服五香連翹湯鑊去血以小豆薄塗之其間數鍼鑊去血又薄之取消也若  
不消色未變青黯者以鍊石薄之若失時不得瘡已爛者猶服五香連翹湯及漏蘆湯下之隨熱多少投  
方也外以升麻湯榻洗之薄升麻膏若生臭惡肉者可以單行一物白蘭如散敷之青肉去盡便停也好  
肉既生但敷升麻膏良不生單敷一物黃耆散也若敷白蘭如散積日青惡肉不盡者可以漆頭赤皮蘭  
如取半錢錢和三大錢錢白蘭如散中合和敷之惡肉去盡遂以瀉用白蘭如散也視好肉欲生可敷黃  
耆散也黃耆散方白蘭如散方漆頭蘭如散方並一味單行隨多少搗篩為散

出第八  
卷中

范汪飛黃散瘡緩疽惡瘡食惡肉方

取丹砂著瓦盆南離黃耆中央礪石北曾青東白石英西礬石上

石膏次鍾乳下雄黃覆雲母薄布下各二兩先搗篩瓦盆中以一盆覆上羊毛泥令厚作三隅蠹燒之

以陳葦一日成取其飛者使之甚妙

又瘡緩疽以飛黃散食惡肉令盡作土蠹重之方

雄黃

雄白尿

藜蘆

丹砂

乾鰾驪魚各一

右五味搗下篩青布裹之重經三日乃止止畢要以蛇銜膏摩之良

附范汪方無蛇銜膏在方中  
附於後並出第三十一卷中

崔氏蛇銜膏瘰癧腫瘰血產後血積耳目暗等牛領馬鞍瘡方

蛇銜

大黃

附子

去黑

芍藥

當歸

外臺必史

卷二十四

緩疽方四首

發背方四十一首



細辛 黃芩 大戟 椒 祛毒草 獨活 路一 薤白 十四 右十二味並切之以苦酒淹之一宿以不

中水成鍊猪膏二升龍銜藤一兩合膏煎名龍銜膏今又有龍草似蛇銜而葉大耳亦有取其根合煎

者亦名龍銜膏 出第二卷中

小品療緩疽初作即以小豆薄塗之亦消也 出第十卷中

發背方四十一首 其乳石發背自有正方 在第三十八卷中具述

尚德樓千金二七注 作七餅 注腎作肩

尚德樓千金作調

千金論曰凡發背皆由服餌五石寒食更生散所致亦有單服鍾乳而發者又有生平不服諸石而自發背者此是上代有服之者其候率多於背兩胛間起初如粟米大或痛或癢仍作赤色人皆初不以為事日漸長大不過十日遂至不救其臨困時方圓徑三四寸高一寸瘡有數十孔以手按之諸孔之膿皆反出尋即失音不言所以養生者小覺背上痛癢有異即取淨土冷水和泥捻作餅子徑一寸半厚二分以麤艾大作炷灸泥上貼著瘡上灸之一炷一易餅子若粟米大時可灸七餅即差若榆莢大灸二七炷即差至錢許大日夜灸不住乃差并服五香連翹湯及鐵漿諸藥攻之乃愈又常以冷水射之漬冷石熨之目夜勿止待差佳手此病忌麪酒肉五辛等亦有當兩腎上發者

又論曰凡服石人皆須大勞役四體無得自安如其不爾多有發動亦不得遂便恣意取煖稱適己情必須違欲以取寒凍雖當時不甯於後在身多有所益終無發動之慮

又發背方 凡腫起於背胛中頭白如黍粟四面相連腫赤黑令人悶亂者名發背也即禁房慎蒜麪不速灸治即入內殺人灸當瘡上七八百壯有人不識多作雜腫瘰之皆死

又方 取亂髮灰酒服方寸

又方 以三年酢滓微火煎令調和牛脂封上日一易

又方 取狗牙反酢和敷之

又方 取猪羊脂封之亦療發乳



尚德按干  
金醋和

尚德按干  
金李根作  
李根皮半  
夏枯莖各  
五兩芎藭  
六兩桔梗  
一兩

尚德按干  
金山菜炙  
以下四味  
各六兩豉  
麥作地胆  
又按地膚  
地膚疑當  
作地麥地  
尚德按干  
金蜀升麻  
作蜀椒乾  
薑二分桂  
心二分芎  
藭二分小  
豆一合半  
尚德按干  
金人參一

又方 以蛇頭灰水和敷之

又方 飲鐵漿三升下利為佳

又方 以鹿角灰酢和塗之陰古今集

又方 燒古蟾末之如粉雞之白和敷上日三即差止

又發背及癰疽潰漏并末潰毒腫方 枯蘗 榆皮 胡鷲窠 鯢鼠土 女人月水布洗取汁 右五

味並須等分以月水汁和如泥封腫上乾即易之潰者四面封已覺即封從一日至五日令差膿

又癰癰疽潰漏發背及小小瘰癧李根散方 李根 半夏 洗枯蘗各一甘草二兩葛根三兩桂心四兩當歸

二通草一兩芎藭半兩白欬兩桔梗兩厚朴炙黃芩各一兩藥四兩附子炮 右十五味為散酒服方寸

寸日三瘡大因者夜再服有患發背骨出身有三十餘癰癰服此差忌羊肉錫海藻菰菜豬肉冷水生

葱同 范注

又治諸虛不足發背癰疽經年差復發或由大風聚結毒氣在內閉塞夏月已來出攻於背久不瘳積

聚作膿血為瘡內漏大內塞排膿散方 山茱萸 五味子 茯苓 乾薑各六兩當歸四兩附子二兩肉苴

蓉八兩石斛五兩菟絲子三分酒分巴戟天八兩瞿麥三分地膚子一兩遠志八分人參 甘草各五兩麥門冬八分石

葦 芎藭各四兩藥五兩乾地黃八兩桂心五兩 右二十味為散酒服方寸寸日三夜一稍加至兩七長服

終身不發癰癰忘同前

又內補散療癰癰發背方 蜀升麻 黃芩 人參各二兩乾薑 白欬 桂心 甘草炙附子炮防風

芎藭 赤小豆各一兩 右十一味為散酒服方寸寸日三夜再一云蜀

又內補散主癰疽發背已潰膿排生肉方 當歸 桂心 人參各二兩芎藭 厚朴炙桂梗 甘草炙防

風 白芷各一兩 右九味為散酒服方寸寸日三夜再瘡未合服勿停范注

又瞿麥散主排膿止痛利小便方 瞿麥 芎藭 桂心 赤小豆 石斛 白欬各半黃耆一兩當歸

發背方四十一首

乙



兩  
又按忌字  
下疑有脫

尚德按十

金雅麥一

兩桂心以

下五味各

二兩

又按此方

與前大異

尚德按十

金六味各

二兩

尚德按十

金半反二

兩先煮竹

葉取一斗

尚德按上

千金作去

尚德按十

金半反二

兩

尚德按十

金雅麥一

兩

尚德按十

金雅麥一

兩

尚德按十

金雅麥一

兩

尚德按十

金雅麥一

兩

尚德按十

金雅麥一

外臺秘製卷二十四

麥門冬各二兩

右九味為散先食溫酒服方寸寸日三忌生葱藥深

又薏苡仁散主令癰自潰長肌肉方 薏苡仁 桂心 乾薑 白斂 當歸 肉蓯蓉略一 右六味

為散先食溫酒服方寸寸日三夜再同

又黃耆竹葉湯主胸背遊熱癰疽方 生地黃兩 黃耆 甘草炙 芍藥 黃芩略三 人參 石膏碎 芍藥

當歸略二 生薑五 大棗三十 半夏四 淡竹葉升切 麥門冬三 右十四味以水一斗二升煮竹葉

取九升去滓內藥煮取三升分四服相去如人行五六里再服日三夜一忌海藻松菜羊肉錫略

又排膿內塞散主大瘡熱已退膿血不止瘡中肉虛疼痛方 防風 茯苓 白芷 桔梗 遠志去 甘

草炙 人參 芍藥 當歸 黃耆略一 桂心分 附子地二 厚朴兩 赤小豆五 右十四味搗散酒服

方寸寸日三夜一忌同前

又麝香膏主諸惡瘡及癰疽發背惡肉方 麝香研 雄黃研 真珠研 礬石略一 右四味細篩以豬膏

攪令如泥塗惡肉盡止更敷生肉膏佳

又瘰癧疽敗壞生肉膏方 生地黃斤半 獨活 當歸 黃耆 大黃 芍藥略一 薤白兩 白芷

芍藥 黃芩 續斷略一 右十味切以臘月豬脂四升煎敷之佳

又方 大黃 附子炮 芍藥 雄黃 真珠略一 白斂 礬石燒 黃芩 蘭茹略二 雌黃 莽草略一

右十一味先以豬膏一升半煎六沸去滓內蘭茹礬石末攪之塗瘡上惡肉盡止同

又方 蘭茹略一 礬石燒 雄黃 研 硫黃略二 右四味為散內瘡口中惡肉盡止勿使過好肉也

又發背上初欲作腫即服此方 梔子仁枚一百 大黃 升麻 黃芩 甘草炙 右五味切以水九升

煮取三升半分三服使利便止不下更進一服忌海藻松菜從瞿麥散以下九方並療發背部中已次

之文仲備急同並出 范汪瘰癧腫發背虎牙散方 虎牙炙 乾薑 附子炮 當歸 甘草炙 防風 桂心 王不留行 茯苓



尚德樓  
疑當作

尚德樓  
疑當作

各一 右九味檮下篩服方寸寸日三忌同前

出第三十卷中

又療癰發背揀膿內補鐵屑散方 當歸 人參 細辛 甘草 芩藹 黃耆 桂心 防風 黃芩

鐵屑 芩藹 芍藥 右十二味各等分合搗為散服方寸寸忌同前

又療癰腫牢核發背成膿莽草膏方 莽草 芩藹 當歸 細辛 附子 炮黃芩 烏頭 炮牛膝 躑

躑 野葛 茯苓 防風 杜蘅 略一豬脂斤 右十四味切用豬肪合煎去滓敷瘡上日再忌同前

又卓氏白膏療癰疽發背金瘡已壞及未敗火瘡諸瘍疥患瘰之方 當歸 附子 炮細辛 芩藹 續

斷 牛膝 通草 甘草 芩藹 蜀椒 芍藥 黃耆 略一 右十二味切咀以猪膏二升煎之

微火上以白芷色黃藥成絞去滓以敷瘡上日三忌同前

又療發背發乳房及諸惡瘡膏方 黃連 當歸 馬齒 芩藹 薯蕷 各一 珍珠 十四 礬石 燒黃柏 各

兩 石葦 三分 生竹皮 合三猪肪斤 右十一味切咀細切肪美酒一升合煎石葦焦膏成去滓有病稍稍

敷上亦可酒服棗核大一枚忌同前

出第四十一卷中

救急瘰癧發背百無不差方 取猪羊脂切作片冷水浸取貼上暖微易之五六十片即差若初貼少許即

寒寒定好眠甚妙

又療發背若初覺赤腫腫上作小瘡疼不可近方 急用鍼刺上七八鍼取冷水用筒擊射腫上日夜不

止疼歌腫消

出第五卷中

又療發背方 取白麝搜圍腫四畔令童子七人尿漬之

又方 以馬糞封之乾易婦人發乳亦差

又方 取尉臬草搗取汁服一雞子滓封上熱即易之

又方 搗地菰汁一升日再服以差止

又方 大黃 石灰 熱小豆 右三味等分末白酒和塗立效忌羊肉熱麪大酢

並出第六卷中



尚處按仕  
疑當作士  
燒一日疑  
當作十日

近效凡發背皆發出自腸胃流入五臟仕流多脚氣為主或有先服乳石并熱肉麵并失機房室過度皆作此疾縱身不曾服乳石先伐服亦有此病或有下里人服麪過度亦有患者請依後方萬不失一發背亦覺有腫即須審看根硬軟如硬頭一點白燒四邊紫黑色時掣痛憎寒不食狀若天行此石癰知是此狀即須當上灸一百壯艾炷如大鼠屎許大凡發背初亦一點白四邊赤色漸漸長大或盈盞并碗許大四邊生飯漿小小瘡如粟米許大亦時時抽掣痛此兩狀皆是死病一日內堪醫十日以外不濟就中冬月得此病即延得三五日其發背初覺即須當頭灸二十一壯如盃許大即五花灸之各二十一壯即服牛蒡子枯婁葛粉第二服犀角湯瀉之不然服犀角丸亦得大效也忌梨鯉魚麵酒肉穀水粥賈顯謨錄凡發背候憎寒壯熱身如拘束或口乾不用食瘡初出如青紫色者毒重赤者輕膿如稀汨者極重膿稠白赤者輕張道士昇玄房陵口錄留

又療惡寒瘡似欲發背或已生瘡腫隱癢起方 硝石兩 右一味以煖水一斗和令消待冷取故青

布疊三重可以破赤處方圓濕布搗根熱即換之頻易差

又療發背及一切毒腫方 生麻油六兩 黃丹二兩 地膽兩 鐵精兩 生栗子四十枚 取大 神右四味和

於銅器中盛用炭火重湯煎候沫溢出與器口欲平取小麥一合分二人嚼取筋急內藥中搗使與相

和膏擊下安銅器冷水中成膏訖以故綿塗膏貼所苦處晨夕換膏

又療前瘡定訖令生肌方 黃四兩 麝香兩 棗皮兩 生麻油合 右三味依法和用大重湯上煎十

餘沸稀稠前藥相似取故綿塗膏貼瘡上膏漸取瘡減唯得喫白羊頭肉但是豆並不得喫餘如藥法

又療癰腫犀角丸主腸癰乳癰發背一切毒腫服之化為水神驗方 犀角分二 蜀升麻 黃芩各四分 大

黃五 防風四 巴豆二枚 熱一枚 黃人參 當歸 黃耆 乾蓼藍 黃連 甘草 炙梔子仁各四 右十

三味搗為末別搗巴豆成膏內末和以杵研搗令相得鍊蜜和搜更搗二百杵煖湯服三丸如梧子

得利三兩行與冷粥止即差不利加至四五丸初服取快利後漸減丸數取鴨澹微洩為度老小以意



增減腫消及和潤乃止利却黃水即覺輕皮皺色變一切腫皆內消神驗不可論忌熱麵蒜豬肉蘆笋魚海藻松采生冷粘食以上並主發背

癰疽發背雜療方二十六首

劉涓子療發背發乳口已合皮上急痛生肉摩跪折丹參膏方 丹參 防風 白芷 細辛 芎藭

黃芩 芍藥 牛膝 大黃 槐子 獨活 當歸各一 右十二味切以臘月猪脂五升微火煎三

上三下膏摩病日三四不須向火古令錄驗同出第五卷中

肘後療諸癰疽發背及乳方 熬菜粉令黑雞子白和之以塗練上貼癰小穿練上作小口以泄毒氣令

散燥復易之此藥神效文神備急同

又方 以釜底土搗取散以雞子中黃和塗之加少鼓彌良以五月蒟及少鹽佳文神備急同本無下一法

又方 取茱萸一升搗之以苦酒和貼癰上乾易之佳

刪繁療癰疽發背九肋大黃薄貼方 大黃 黃芩各三 白芷二 寒水石 白欬各五 黃柏二 石膏 赤

石脂 黃連各三 右藥下篩以三合投粉麝二升中和之薄塗紙貼腫上燥易之腫下止不下厚敷

之忌生冷熱麪大酢

又蠅皮散療諸瘻及浮核壞敗并主男子發背女子發乳等癰疽或膿血肉瘤方 蠅皮燒具杜仲八分

斷續 附子炮地榆各五 厚朴分藥本 當歸 桂心各五 小露蜂房燒具 右十味搗篩為散服方

寸寸日三服酒進取差止忌豬肉生葱冷水

又陵鯉甲散療發背乳房癰腫方 陵鯉一頭取甲炙桂心各當歸仁 右三味搗篩為散服方寸寸日三服

酒進出第九卷中

千金療癰疽發背猪蹄湯方 猪蹄如饌 黃耆 黃連 芍藥各三 黃芩三 薔薇根 狼牙根各八

右七味以水三斗煮蹄令熟登取二斗清切藥煮取一斗洗瘡一食頃以綿拭燥著生肉膏日二差生



又療癰疽發十指或起膀胱及發背後生惡肉方 猪蹄一箇歸 大黃 芍藥 芍藥 黃芩 獨活

右八味蹄取膝下斷治如食法以水二斗煮取八升內藥煮取四升去滓漬瘡兩食頃拭

令燥以麝香富敷之其方在前後背部中只有四味者是也

又生肉膏主癰疽發背已潰令生肉方 甘草炙當歸 白芷 茯苓 蜀椒 細辛各二兩 烏喙六枚 鹽白

乾地黃<sup>三兩</sup>續斷<sup>一兩</sup>蛇<sup>無以</sup>右十味以好酢半升相和漬二宿猪膏三斤煎令三沸三上三下膏

成使用子同

又癰發腹背陰匿處通身有數十者方取牛糞乾者燒擣下重絹以雞子白和塗之乾復易

若已結膿使聚長者方以生枯蔓根細搗苦酒和敷上燥復易之末赤小豆亦佳

凡發背為癰疽已潰未潰者方以香豉三升少與水和熟搗成強泥可腫作餅厚三分已有孔勿覆

孔可腫上布鼓餅艾列其上灸其鼓使溫溫熱而已勿令破肉也其熱痛急易之癰疽當減便得安或

一日二日灸之若先有瘡孔中汁出即差并備急文仲翼同

及癰腫發背初作及經十日以上腫勢熾然毒氣猛盛日夜疼痛百藥不治者方  
蝦蟇雞子一枚新出狗

矢如雞子大  
右二味攪令調和微火熬之令稀稠得所捻作餅子腫頭堅處貼之以紙貼上以綿抹之時

時看之覺餅子熱即易勿令動轉及歇氣經一夜定其多日患者三日貼一度差止

謹按千金論曰此方穢惡不可施於

貴勝然其愈疾一切諸方皆不及又自外諸方還復備員作儀注而已學者常當曉斯以備諸急云耳並出第二十三卷中

千金翼諸癰腫發背及癰瘡已潰爛疼痛方 蒸麝穀更燒熨之當即愈

連翹五香湯主一切惡核瘡腫方  
連翹 射干 升麻 獨活 桑寄生 通草各二兩 大黃三兩 丁香

一青木香 沉香 薰陸香 麝香 右十二味 以水九升 煮減半 內竹瀝二升 煮取三升

分三服末差中間常服佳

尚德按千金以水三斗煮  
尚德按千金六枚作六分續斷  
宿作一作  
尚德按千金為作及可作依已  
字下有上字凡可腫  
上作孔上二日作二  
度  
通按眼青  
段不成子  
也  
尚德按千金無段字  
又按千金云三日胎  
之一日一  
易德按糜  
穀疑當作  
糜穀



尚德按千  
金翼麝香  
一兩

又五香湯主惡氣毒腫方 沉香 青木香 丁香 薰陸香略 麝香詳 右五味切以水五升煮取

一升半分三服集驗方用雞古香一兩不  
用丁香出第二十四卷中

崔氏療發背及諸瘡久不差有效方 先以甘草湯洗瘡拭極乾乃嚼胡麻敷上乾即易從旦至日西去

胡麻乃取黃連末滑石末中半相和以敷瘡上數數易明日又依前敷胡麻及黃連等末更不須洗瘡

不過六七日即差急效備

又連翹湯療惡瘡腫而渴方 連翹 蜀升麻略 黃芩三兩 枳實二兩 乾藍三兩 芍藥 玄參 白斂 甘

草炙 羚羊角屑 通草 黃耆各二兩 大黃三兩 右十三味切以水八升煮取二升半分三服利一兩行後

更服去大黃乾藍即不利忌海藻菘菜

又犀角飲子方 犀角屑 羚羊角三兩 右二味以水八升煮取三升渴即飲盡更作之時熱恐壞懸者

井底甚妙

又五香連翹湯療惡瘡執毒腫惡毒氣入腹兼取利以洩毒氣方 連翹三兩 蜀升麻 薰陸香各二兩

竹瀝升 麝香研 分青木香二兩 丁香一兩 獨活二兩 寄生二兩 射干 甘草各二兩 沉香二兩 大黃四兩 朴硝二兩

熱乾 別內 右十四味切以水一斗煮取二升半絞去滓然後內大黃朴硝竹瀝更煮一兩沸去滓內麝香

分溫三服服別相去如人行十里久以得利一二行為度慎雞猪魚蒜生冷酥滑油膩麪食小豆五辛

葵菜等備急大仲同並

備急葛氏療始發諸癰疽發背及乳房方 皆灸上百壯半夏末雞子白和塗良姚云生者袖驗以水和

塗之肘後文仲古今  
錄驗小品並同

又方 以酢和墓上土菜葉擣盡小蒜薄貼並良肘後文仲同並  
出第四卷中

救急療熱毒風丹并發背犀角膏方 犀角六分 升麻十分 大羚羊角六分 梔子仁二枚 薤白一枚 吳藍八分

得玄參 續斷 大黃 白斂 射干 白芷各六分 蛇銜一枚 寒水石一分 黃芩六分 慎火草一枚 麻黃



尚德按千金夏有桂心度作薑又按千金無此方

六分 右十七味切以竹瀝三升生地黃汁五合漬藥一宿內猪脂二升微火上煎十上十下候白芷黃膏成去滓塗病上

文仲療發背及婦人發乳及腸癰木占斯散方 木占斯 厚朴炙甘草炙細辛 桔萸 防風 乾薑

人參 桔梗 敗醬草略一 右十七味為散酒服方寸寸日七夜四以多為度病在上當吐病在下當

下膿血此謂腸癰之屬凡癰腫即可服兼療諸疽痔若瘡已潰便早愈發背無有不療長服去敗醬亦

療婦人諸產癰瘡益良是劉涓子方千金范汪刪繁古今錄驗同出第五卷中

古今錄驗療諸癰瘡發背有膿血當歸貼方 當歸 蟪螬 丹參 附子 地蠟蜜略一 梔子 枳桂心

膠略一 右八味合煎以貼瘡上出第二十卷中



唐王靈先生外臺秘要方卷二十五目錄痢三十門

水穀痢方一十首

水痢方六首

久水痢不差腸垢方四首

冷痢方二十二首

冷痢食不消下方六首

白痢方八首

重下方六首

卒暴冷下部疼痛方二首

冷熱痢方七首

熱毒痢方三首

熱毒血痢方六首

赤痢方四首

久赤痢方二首

卒下血方七首

血痢方六首

久血痢方三首

蠱注痢方三首

腸蠱痢方一首

膿血痢方七首

赤白痢方六首

久痢白痢方四首

瘡痢方六首

久瘡痢及久痢成瘡方九首

數十年痢方一十一首

休息痢方五首

腹肚不調痢方一十一首

洩痢不禁不斷及日數十行方三首

下焦虛寒及遠血近血方二首

下痢食完出及上入下出方一首

下痢腸滑方三首


大注痢及赤白困篤腸滑方二首

痢氣渴方二首

許仁則痢方七首

尚德按今有方八首







唐王壽先生外臺秘要方第二十五卷

宋朝散大夫守光祿卿直祕閣判登聞鼓院上護軍臣林億等上進

新安後學程行道敬通父訂梓

水穀痢方一十首

尚德按開  
病源作內  
宋本同  
又按其藏  
病源作藏  
府宋本同

通按頭多  
汗一本作  
頭多汗

尚德按李  
病源作菓

九字下果  
本有忌海  
藻松菜猪  
肉生冷等

病源水穀痢者由體虛腠理開血氣虛春傷於風邪氣留連在肌肉之間後遇脾胃大腸虛弱而邪氣乘之故為水穀痢也脾與胃為表裏胃者脾之府也為水穀之海脾者胃之臟也其候身之肌肉而脾氣主消水穀水穀消其精化為榮衛以養其藏充實肌膚大腸肺之腑也為傳道之官化物出焉水穀之精化為血氣者行於經脈其糟粕行於大腸也肺與大腸為表裏而肺主氣其候身之皮毛春陽氣雖在表而血氣尚弱其飲食居處運動勞役血氣虛者則為風邪所傷客在肌肉之間後因脾胃氣虛風邪又乘虛而進入於腸胃其脾氣弱者不能剋制水穀故糟粕不結聚而變為痢也又新食竟取風名為胃風其狀惡風頭多汗膈下塞不通食飲不下腹脹形瘦腹大失衣則臍滿食寒則洞泄洞泄者痢無度也若胃氣竭者痢絕即死診其脈小手足寒難療也脈大手足溫易療也下白沫脈沉則生浮則死身不熱脈不懸絕滑大者生懸濡者死以藏期之也脈絕而手足寒難療也手足溫者生脈不還者死脈緩時小結者生洪大數者死懸濡者死以藏期之也脈絕而手足寒難療也手足溫者生脈不還者死脈緩時小結者容平天氣以急地氣以明早臥早起與雞俱興使志安寧以緩秋刑收斂神氣使秋氣平無外其志使肺氣清此秋氣之應養收之道也逆之則傷肺冬為殄洩又云五月勿食未成核果及桃李發癰瘡不爾發寒熱變黃疸又為洩利

廣濟療赤白水穀冷熱等痢方 地榆 白木 赤石脂 厚朴 乾薑 熟艾 龍骨 甘草

黃連 分十烏梅 分六人參 分六當歸 分五 右十二味搗篩為末蜜丸以米飲汁服二十九如梧桐子大日

三服加至三十九 卷中



十字

集驗論黃帝問曰人若溼洩下痢者何也對曰春傷於風夏生溼洩腸澼久風亦為溼洩也

又療熱水穀下痢黃連阿膠湯方 黃連 阿膠 各二兩 梔子 枚三十 烏梅 枚二十 黃柏 兩一 右五味切以水七

升煮取二升半分為再服神良 備急同 附後名 烏梅湯療熱下痢

又方 黃連 一升 金 陳米 五升 右二味以水七升煮取二升分再服 附後文仲同並 出後四卷中

刪繁療中焦熱水穀下痢藍青丸方 藍青 升三 黃連 兩八 黃柏 兩四 阿膠 兩五 白朮 兩一 地榆 兩一 地膚子 兩一 烏梅 兩一

肉略 三 右八味搗篩為散用藍汁和微火上煎取可為丸九如杏子大飲酒三九 出後四卷中

崔氏療水穀痢方 乾薑 分三 雞子 枚二 小豆 妙 二兩 黃連 分三 右四味搗篩三味內雞子黃白中熟攪令相

得微火上炒令可丸一服五十九如小豆大旦以斂服差即停 出後三卷中 宋本有字下有食脂膩生冷瘡肉魚蒜葱十

文仲療因仲夏熱多令人發水穀痢腸中鳴轉一瀉五六升水方 黃連 五兩 厚朴 兩三 右二味切以水

三升煮取一升頓服之 出後三卷中

必效療水穀痢方 小豆 一升 臘 二兩 右三味和頓服之即愈

又方 檳榔 皮 燒反 尚德按 煎取當作 右一味研以水和服三方寸寸 並出後二卷中

古今錄驗療熱水穀下痢方 黃連 阿膠 各二兩 梔子 枚二十 右三味切以水七升煮取二升分為三服

又方 黃連 當歸 甘草 炙 酪 酸石榴皮 三兩 右四味切以水三升煮取一升半分為三服 並出後十卷中

水痢方六首

廣濟療水痢及霍亂崔氏方同云冷痢食不消化及有白膿日夜無節度但疑是冷悉主之方 白石脂

乾薑 各八分 右二味搗篩為末以沸湯和少許麴薄糊和藥餅手捻作丸如食法下不止加乾薑八兩

忌如常法

又療水痢腹中氣方 茯苓 白龍骨 八分 訶梨勒皮 八分 黃連 八分 酸石榴皮 八分 右五味搗篩為末蜜丸

本有忌猪

服字下宋

肉冷水五



止字下宋  
本有忌猪  
肉油藏生  
冷等八字  
之字下宋  
本有忌猪  
肉冷水五  
字  
高樓按半  
骨反三字  
疑當細書  
連亦得二  
字在朽骨  
反下三味  
疑當作二  
味李時珍  
本草中骨  
下引之無  
朽骨反止  
二味  
枚字下宋  
本有辟字

空心以飲服如梧子大三十九日二服差止出第四卷中

大仲療水痢百起者馬蘭散方 馬蘭子 乾薑 黃連原無分兩 右三味為散熟煮湯取一合許和二方寸寸八腹即斷冷熱皆治常用神效不得輕之

又方 朽骨灰 牛骨灰亦得神效 有六月六日造五字 右三味等分為散空腹飲服一方寸寸無六月六日麴時用常麴亦得御傳並出第三卷中

經心錄主水痢方 雞子枚 黃臘一兩 尚德按 右二味熬熟食之宜空肚食之日三服佳

又方 黃連 倉米各三 右二味作散和雞子七枚令熟併捻作丸煮赤豆作漿粥服三十九日三服若渴但飲豆漿粥並出第二卷中

久水痢不差腸垢方四首 病源腸垢者腸間津液垢膩也由熱痢蘊積腸間虛滑所以因下痢而便腸垢也出第十卷中

肘後療水下積久不差腸垢已出者方 烏梅枚十 右一味以水二升煮取一升頓服之又方 石榴枚 右一味合皮搗絞取汁隨多少服之最良

備急療水下積久不差腸垢已出者方 赤石脂 桂心 乾薑 附子炮 右四味等分搗篩蜜丸如小豆每服三九日三服飲下肘後同出第六卷中

文仲治久水痢難斷方 黃連二兩 黃柏二兩 阿膠一兩 右三味搗篩為散以苦酒蜜各半升煮內阿膠令烊又內諸藥令可丸飲三九日四此是古方極要

冷痢方二十二首 病源冷痢者由腸胃虛弱受於寒氣腸虛則泄故為冷痢也凡痢色青色白色黑皆為冷也色黃色赤並是熱也故痢色白食不消謂之寒中也診其脈沉則生浮則死出第十卷中

廣濟療冷痢青白色腹內常鳴其痢行數甚疎出太多此是冷痢宜服調中散方 龍骨 人參 黃連

久水痢不差腸垢方四首 冷痢方二十二首



凡字下米  
本有欲多  
作依此法  
也七字

服字下米  
本有忌猪  
肉冷水五  
字  
尚德按臘  
疑當作蠟  
下同含疑  
當作含  
之字下米  
本有忌猪  
肉冷水五  
字

尚德按麴  
千金作麴

阿膠炙黃柏右五味搗篩為散煮米飲服兩方寸寸日兩服差停出第四卷中

肘後療水下痢色白食不消者為寒下方黃連乾薑略三右二味搗篩白酒一升半合煎合可九

飲服如梧桐子二十九忌豬肉冷水

又方黃連二甘草附子炮半阿膠半兩右四味切以水三升煮取一升半分再服之

又方半夏洗烏頭甘草炙右三味搗篩蜜和丸如梧桐子大飲服三九日再服

又方生薑汁仁白蜜升右二味相和分再服之

又方腥切二兩乾薑三兩右二味以水六升半著米一合煮作糜爛熟內薑一食合盡不差更作備急

又方酸石榴皮反燒右一味為末服方寸寸文仲

又方乾薑二兩雜麴升右二味為燒餅熟食之盡更作不過三劑差文仲

又療純下白如鼻涕者方龍骨乾薑附子炮右三味等分搗篩蜜和丸如梧子大飲下五九漸

至十九日一服文仲

又方黃連末臘阿膠各一右三味先以酒半升令沸下膠臘合烱乃內黃連末頓服之本云姚氏

並病血一日  
夕數十行

又方灸臍下一寸五十壯良文仲同並出第二卷中

千金論曰凡五臟絕於內者下不自禁下甚者手足不仁也細尋取之萬不失一下病體例略如此耳素

問曰春傷於風夏為膿血夏多滯下也夏傷於風秋必洞泄秋下水者患必是冷也

又療久冷痢下純白者此由積臥冷處經久病發遂令脾胃俱冷日夜五六十行大小腹痛不可忍之凡

白痢屬冷赤痢屬熱方上好麴末五升右一味溫清酒熱和麴末一升空腹一頓服之日三若

至食時搗蒜一升令至熟下薑椒末調如常食法惟須稠勿加鹽以水和麴二升作索餅極熟爛煮之

乾澆熱內蒜薑中相和一頓食之少與餘食至飢時仍準前食麴末酒比至差來少食餘食以此法療



尚德樓千金烏梅二

百粒黃連十兩傷寒論與外臺

又按千金無之如二十斗作升

宋本有忌猪冷水生葱

生菜十一

高德樓充亦千金作

再字下宋本有忌猪

肉冷水生葱七字

尚德樓應疑當作鯁

麵宋本作麵下同

服字下宋本有忌猪

藻菜猪肉冷水九

字 饒宋本作饒既

如宋本作

不過二日必差

又烏梅丸療冷痢久下方 烏梅三百粒 當歸四兩 乾薑十兩 桂心六兩 附子六兩 黃連十六兩 蜀椒四兩 細辛六兩

人參六兩 黃柏六兩 右十味異檮歸合治之苦酒漬烏梅一宿去核蒸之如五斗米下擣如泥盤中揉合

相得蜜和擣二十杵食前飲服如梧子大十九日三稍增二十九此本仲景傷寒論方

又舊療痢於貴勝用健脾丸多效今療積久冷痢先以溫脾湯下訖後以健脾丸補之未有不效者貧家

難以充亦亦不可將息溫脾湯方療積久冷痢赤白者 大黃三兩 桂心三兩 附子三兩 乾薑二兩 人參二兩 右

五味切以水七升煮二升半分為三服日再並出第十卷中 備急葛氏療痢色白食不消者為寒下方 豉一升 綿裹一升 白一升 右二味以水三升煮取二升及熱頓服之

陶效方云療暴下大去血痢姚療赤白下痢并效附後 又方 牛角腮反燒 右一味擣篩白飲服方寸寸日三附後

又方 好麴炒 右一味擣篩煮米粥內麴方寸寸日四五云此療日百行師不救者附後 古令錄驗白頭翁湯療寒急下及滯下方 白頭翁 乾薑各二兩 甘草二兩 當歸一兩 黃連一兩 秦皮各一兩 石

榴皮者二兩生 右七味切以水八升煮取三升分為四服出第十卷中 近效療冷痢方 肉豆寇五顆合皮碎 甘草二兩 右二味切以水三升煮取一升半頓服之戶部李尚書處得云療冷痢極

者有效自 又療久冷痢方 石赤脂擣作末 和麴饒饒饒饒 空腹服一疏以下不過兩頓差老人尤佳體中先熱者不可

服之以上二方新附 文仲治青下白下並附散方 乾薑 附子炮 皂莢炙去子 右三味稱分擣篩為散飲服方寸寸不過再服

即愈亦可丸服小品後同 又治冷痢薑文饒饒子方 乾薑未熟 炙 右二味等分作麴饒饒如酸棗大煮熟服四五十枚日二服

又治冷痢薑文饒饒子方 乾薑未熟 炙 右二味等分作麴饒饒如酸棗大煮熟服四五十枚日二服

又治冷痢薑文饒饒子方 乾薑未熟 炙 右二味等分作麴饒饒如酸棗大煮熟服四五十枚日二服

又治冷痢薑文饒饒子方 乾薑未熟 炙 右二味等分作麴饒饒如酸棗大煮熟服四五十枚日二服

又治冷痢薑文饒饒子方 乾薑未熟 炙 右二味等分作麴饒饒如酸棗大煮熟服四五十枚日二服



歸字下宋  
本有忌熱  
麵海藥  
菜桃李在  
肉等十二  
字  
尚能按臘  
疑當作臘  
下同

宋本九字  
下有忌猪  
肉冷水桃  
李在肉生  
葱海藥  
菜十五字  
仲作孝  
大宋本作  
以  
九字下宋  
本有忌熱  
肉冷水桃  
李在肉生  
葱海藥  
菜十五字  
李在肉等  
十八字  
味宋本作  
末

病源按薄  
病源作薄

腹脹者多厚朴煮汁服藥此熱服訖即須食飯大效曾有產婦冷痢如白膏服之立差腹痛亦定

冷痢食不消下方六首

廣濟療脾胃氣微不能下食五內中冷及微下痢方

白木八神麵末五兩甘草炙乾薑炙枳實炙各各右

五味搗篩蜜和丸空腹以溫酒服如梧子大二十九日二服漸加至三十九腹中痛者加當歸出第四

文仲華佗治老小下痢柴立不能食食不化入口即虫命在旦夕久痢神驗方 黃連末并雞髮灰上

瀉苦酒上蜜上白臘方寸雞子黃一枚右六味於銅器中炭火上先內苦酒蜜臘雞子黃攪調乃內黃

連末髮灰又攪煎視可搏出為丸久因者一日一夜盡之可者二日盡之附後同出

延年增損黃連丸主腹內冷食不消及冷痢兼補方 黃連黃耆各各三龍骨當歸甘草各各五乾薑

厚朴炙各各地榆白木人參各一右十味搗篩蜜丸如梧子大飲酒任下服十五丸日再服加至

二十九蔞中

又地榆丸主冷痢不消食腹中脹痛氣滿不能食方 地榆六兩赤石脂七兩厚朴六分白木五分乾薑六兩龍骨

各各黃連分當歸分熟艾分烏梅肉分甘草四分右十一味搗篩蜜和丸如梧子大飲服二十九日二

服加至二十五丸並出第

又深師療冷痢下膿血絞臍痛食不消腹脹方又深宋本 吳茱萸乾薑各各六赤石脂 麴末炒各各厚

朴炙當歸各右六味搗篩蜜和丸如梧子空腹以飲下四十九日再

又療冷氣久痢臍下痛出白膿食不消方 吳茱萸人參 芎藭桔梗 甘草炙各各枳實炙 乾薑

各各十二附子各各八麴末各各二十分右九味搗篩蜜和丸如梧子空腹飲下七丸日二服漸加之大久寒氣

逆服滿面目瘥

黃食不消化

白痢方八首  
病源白滯痢者腸虛而冷氣客之薄於腸間津液凝滯成白故為白滯痢出第十



再字下宋  
本有忌生  
由油膩小  
豆粘食海  
藻蒜菜醋  
物等十六  
字無服字  
尚德按十  
金腸作腹  
赤石脂肚  
蠟各三兩  
又按千金  
橘皮三兩  
二兩下宋  
本有忌桃  
李在肉海  
藻松菜猪  
肉冷水等  
十四字  
同前二字  
宋本作海  
藻蒜菜四  
字

廣濟療白膿痢方

甘草

六分厚朴十二分乾薑

枳實

茯苓各八分

右五味切以水五升煮取一升六

合絞去滓分為二服日再服

又療心腹脹滿不能下食及痢白膿方

厚朴

五兩豆蔻五枚甘草一兩

乾薑一兩

右四味切以水五升煮

取一升五合絞去滓分為二服日再

並出第四卷中

有忌生冷油膩海藻蒜菜九字

千金大桃花湯主冷白帶痢腸痛方

赤石脂

兩乾薑當歸

龍骨兩各三附子炮

牡蠣兩各二芍藥甘

草

笑各人參半兩

白木升

右十味切以水一斗二升煮白木取九升內藥煮取三升分為三服膿者

加厚朴三兩嘔者加橘皮二兩

又方

龍骨

兩厚朴三兩赤石脂五兩當歸兩

右四味切以水七升煮取二升半分為三服日再服熱加

白頭翁十分牡蠣三兩

尚德按千金當歸三兩

延年烏梅肉丸主冷白膿痢食不消方

子以飲服十五丸日三服忌同前

烏梅肉煮

熟艾

黃柏

甘草

必效白痢方

卷中

麻子汁

右一味以汁煮取藥盡空腹飽服極效

又方

黃連末

右一味以水和每服三匕即愈

並出第二卷中

古今錄驗療白帶下晝夜無復數龍骨湯方

龍骨

牡蠣兩各三烏梅肉

熟艾

白頭翁

乾薑各一兩

女萎

黃連

當歸各二甘草六兩

右十味切以水七升煮取三升二合分服日三夜一斷便止忌

同前

出第十卷中

重下方六首

病源此謂令赤白帶下也令人下部痠重故曰重下去膿血如雞子白日夜數十行繞臍痛也

出第十卷中

肘後療重下方

黃連升

右一味以酒五升煮取一升半分溫再服臍當小絞痛則差

又方

鼠尾草

右一味以濃煮煎如薄飴糖服五合至一升日三赤下用赤花者白下用白花者佳也

升字下宋  
本有切字

升字下宋  
本有切字

升字下宋  
本有切字

升字下宋  
本有切字

升字下宋  
本有切字



同字下宋  
本有忌猪  
肉三字

服字下宋  
本有忌猪  
肉冷水五  
字  
尚德按  
下字下金  
更有下字  
尚德按  
下字下金  
云云大治  
諸久痢不  
痊  
又按臘十  
金作端

療字下宋  
本有冷字  
又據宋本

支仲備  
急同

文仲隱居效驗方主下部絞痛重下下赤白方 當歸 黃柏 黃連 乾薑各二 右四味搗篩煮取

烏梅汁服方寸匕日三若腹中絞痛加當歸下赤加黃連下白加乾薑大效神驗良秘之備急同出

備急療重下方此即赤白痢下也令人下部疼重故名重下葛氏方 致熱令 右一味搗服一合日再三

服又教致令焦水一升淋取汁服冷則用酒淋日三服之附後文仲同

古今錄驗重下下赤者方 取賴赤糞下白取白 右一味以飲清旦空腹服一小杯三旦飲之即愈

又療得毒病後得重下赤白絞痛方 石鍾乳研 兩 黃連 防風 附子 炮黃柏 蜀椒汗 當歸 乾薑

各二 右八味切以水六升煮取二升半分三服適寒溫服並出第十卷中

卒暴冷下部疼悶方二首

千金療卒暴冷下部疼悶方 燒磚冷熱大酢沃之三重布覆坐上取差

又方 黍米升 臘 羊脂 膠炙 兩 右四味合煮作粥一頓令盡即差並出第十卷中

冷熱痢方七首

病源夫冷熱痢者由腸胃虛弱宿有寒而為客熱所傷冷熱相乘其痢乍黃乍白是也若熱搏於血血滲

腸間則變為血痢也而冷伏腸內搏津液則變凝白則成白帶亦變赤白痢也其湯燖鐵石別有正方補

養宣導今附於後養生方導引法云泄下有寒者微一作引氣以息內腹徐吹息以鼻引氣氣足復前即

愈其有熱者微呼以去之也出第十卷中

刪繁療下焦冷熱不調暴下赤白痢香豉湯方 香豉升 白朮六兩 薤白切 一升 麻兩 右四味切以水七

升煮取二升半分為三服出第四卷中

古今錄驗生春石榴瘕熱不調下或滯或水或赤白青黃者方 礞石榴枚 右一味合殼春絞取二升

汁分服五合稍稍服二升盡即斷小兒以意服二三合佳千金同出



作吳楚  
尚德機  
疑當作蠟  
下並同  
九字下宋  
本有忌海  
藻松菜猪  
肉冷水九  
字

尚德機溫  
發當作濕  
劉字以下  
十三字宋  
本大書

良字下宋  
本有忌猪  
肉冷水海  
藻松菜九

又深師無問冷熱新舊痢方 黃連 黃柏 乾薑 甘草 烏梅肉 附子 臘子 右八

味搗篩以蜜和臘於中鑄鑄之其著蜜須候臘鑄盡如乾薑蜜九空腹以飲服四十九日二漸加至五

六十九

近效療痢無問冷熱神驗黃連九方 黃連一茯苓二阿膠一兩 右三味先搗黃連茯苓為末以少許

水溶阿膠和為九眾手九之暴乾量患輕重空腹以飲下三四十丸漸漸加至六十九不過五六服必

差常用之極效

又療苦下無問冷熱及膿血痢悉主之方 生犀角 黃柏 黃連 苦參 右四味搗篩為散

以糯米煮作飲莫令生每日空腹服一方寸匕日再服便差勿輕之 此方於度支王即中處得曾用極

佳

崔氏治痢無問冷熱赤白久新并痞溫 劉叔監積年患痢 阿膠二兩一兩銷作清黃連一兩乾薑二兩黃無

食子 二枚久痢腸滑甚 右四味搗篩為末以醋鑄膠清頓和丸如梧子飲服二十五丸日再漸加至

三十九老小者以意斟酌禁如常法 以粥飲下出第三卷中

又仲治無問冷熱及五色痢入口即定方 黃連 黃柏 當歸 黃芩 阿膠 熟艾 右六

味搗篩為散以醋二升煮膠烱下藥煎令可丸如大豆飲服七八十九日二夜一服時宜老人若產婦

痢加蒲黃一兩蜜和為丸神驗 卷中

熱毒痢方三首

肘後若下色黃者協毒熱下也療之方 梔子 右一味搗篩蜜和丸如梧子飲服三九日再服

卷中

千金療熱毒痢方 苦參 橘皮 獨活 阿膠 藍青 黃連 鬼箭羽 白黃柏 甘草 右九味

等分搗篩以蜜烱膠和併手丸如梧子乾以飲服十九日三稍加之卒下症痢者大良 出第十



字

外臺秘要卷二十五

赤痢方四首

文仲治熱痢久不差者黃連丸方 黃連末以雞子白和丸如梧子飲服十九至二十九日三

熱毒血痢方六首

廣濟療熱毒痢血其痢行數甚數痢出不多腹中刺痛此是熱痢宜生犀角散方 生犀角末 酸石榴皮

熱積實各三兩 右三味各異搏篩為散以飲服兩三寸匕日再差停熱食物

又療熱毒痢血片臍下絞刺痛方 升麻 地榆 茜根 黃芩各六兩 犀角生 地黃分 梔子七枚 薤白

分香豉合 右九味切以水六升煮取一升五合絞去滓分溫三服日再並出第

千金大熱毒純血痢療不可差者方 黃連六兩 右一味切以水七升煮取二升半夜露著星月下旦空

腹頻服之即將息不差加黃連二兩更作服之仍不差者以瘡痢法療之佳忌如常

又療熱毒下黑血五內攪切痛日夜百行氣絕欲死方 黃連升 龍骨 白朮各二兩 阿膠炙 乾薑 當歸

赤石脂各三兩 附子炮 右八味切以水一斗煮取五升分為五服余以正觀三年七月十二日忽得

此痢於五日將絕處此藥入口即定並出第十卷中

古今錄驗療熱毒下血及豆汁犀角煎方 犀角屑 人參 當歸各三兩 黃連四兩 蜜合 右五味切以水五

升煮取一升去滓內蜜煎三沸分為三服日三忌同並出第十卷中

文仲治熱毒痢血犀角散方 生犀角三兩 石榴皮燒 黃連三兩 乾薑二兩 地榆二兩 右五味搏篩為散以

米飲服三方寸匕日三服並出第三卷中

赤痢方四首

病源此由腸胃虛弱為風邪所傷則成痢挾熱熱乘於血則血流滲入腸與痢相雜下故為赤痢也並出第十七卷

集驗療下赤痢方 秫米一斗 鯽魚二斤 薤白一虎口 右三味合煮如作粥法噉之並出第四卷中

千金療赤帶下方 成煎緒膏合 清酒五升 右二味以緩火煎十沸適寒溫頓服之取差止

尚德按千

再字下宋 本有忌諸 熱物四字 尚德按黃 連千金作 常字下宋 本有法字 尚德按攪 千金作攪 定字下宋 本有忌諸 肉冷水枕 李崔肉九 同字宋本 作豬肉冷 水四字



金龜赤句  
澤下

差字下宋  
本有東服  
如前四字

尚德按千  
金二味各  
一升屋塵  
水一升分  
二服

痢字下宋  
本有忌猪  
肉冷水五  
字

又論曰凡痢病通忌生冷酢滑豬雞魚油乳酪酥乾脯醬粉醃食所食諸食皆須大熟爛為佳亦不得傷

飽此將息之大經也若將息失所聖人不救也並出第十卷中

必效療赤痢方 香溪鼓升半黃連兩一 右二味以水一升半浸鼓一日瀝取汁碎黃連薄綿裹鼓汁中煎

取強半升空腹頓服即止桑泉蔣尉云效出第二卷中

崔氏治赤痢黃連丸方 陳倉米四黃連四乾薑四 右三味搗篩為末緩火炒令色變以內二顆雞子

白中熟和丸如梧子大空腹服五十九丸以好無灰酒溫一盞下之至晚間痢赤色當變白明旦即差出第三卷

三卷

久赤痢方二首

病源久赤痢者由體虛熱乘於血血滲腸間故痢赤腸胃虛不平復其熱不退故經久不差胃氣逆則變

為嘔噦也胃虛穀氣衰蟲動侵食則變為蠱也出第十卷中

千金療下赤連年方 地榆 鼠尾草兩各一 右二味切以水二升煮取一升分為二服如不差取屋塵

水盡去滓服一升日二服古今錄驗服屋塵汁一小盃餘同此是徐平方療下血二十年者若不止重

服即愈附後

又方 鼠尾草 薔薇根 秦皮用柳皮亦得 右三味等分水淹煎去滓以銅器重釜煎成丸如梧子服五

六九日三稍增差止亦可濃汁服半升出第十卷中

卒下血方七首

深師治卒下血晝夜七八行方 黃連 黃柏各四兩 右二味切以瀉苦酒五升煮取一升半分為二服

亦療下痢

又療卒下血蒲黃散方 蒲黃三當歸一鹿茸一 右三味搗篩為散飲服方寸匕先食日三並出第六

中卷



集驗療卒下血不止方 草龍膽握 右一味切以水五升煮取二升半分為五服如不差更服出第四卷中

葛氏療卒下血方 小豆仁 右一味搗碎水三升和絞取汁飲之姚云立止

又方 黃連兩黃柏兩梔子枚 右三味切以酒二升漬一宿去滓煮三沸頓服之並出第十卷中

崔氏治卒下血不止方 竈突中塵升黃連兩地榆兩 右三味搗篩為散粥飲服方寸匕日再服重者

夜一

近效治卒下血不問丈夫婦人立效牛角鰓灰散方 黃牛角鰓一具燒赤 右一味為細散食前濃

煮豉汁和二錢匕重者日三神驗

血痢方六首

病源血痢者熱毒乘於血血滲入大腸故也血之隨氣循環經絡通行臟腑當無停積毒熱氣乘之遇腸虛者血滲入於腸腸虛則洩故為血痢也身熱者死身寒者生診其關上脈亢大便秘去血暴下血數升也

出第十卷中

廣濟療血痢黃連丸方 黃連 白龍骨炙禹餘糧 伏龍肝各八分代赭研乾薑各六分 右六味搗篩蜜

和丸飲服三十九如梧子漸加至四十九差止

又療痢鮮血方 茜根 黃連 地榆各八分梔子十四枚蘆白切香豉各八分犀角屑六分 右七味切以水八

升煮取二升分為三服日再服出第四卷中

必效療患熱血痢方 粳米研升 右一味研碎令米盡取汁可一大升於新磁瓶中盛取油絹蜜閉頭

繫內著并水中令至明飲之傳與人無不差者出第二卷中

古今錄驗療血痢及膿血方 黃連三兩 右一味切以清水三升漬一宿旦煎取一升半去滓分為二服

服令須臾盡出仲

又療下痢鮮血方 乾地黄 犀角屑地榆各二兩 右三味搗篩蜜丸如彈子大每服一九水一升煎取

之字下米 本有忌猪 肉冷水五 字 尚德按鯉 疑當作鯉 下同 黑 豨 宋本作

尚德按乘 病源作折 又按當病 源作常宋 本同

止字下米 本有忌猪 肉冷水五 再字下米 本有忌猪 肉冷水五 字

盡字下米 本有忌猪



肉冷水五

差字下宋  
本有忌猪  
肉三字  
人參上宋  
本有上黨  
二字

更服下宋  
本有忌猪  
肉冷水五  
字  
四服下宋  
本有忌猪  
肉冷水五  
字

五合去滓溫服之

又療下血痢地膚散方 地膚五兩 地榆根 黃芩各二兩 右三味搗篩為散以水服方寸匕日三並出第二

中卷

久血痢方三首

病源此由體虛受熱熱折於血血入腸故成血痢熱不歇胃虛不復故痢血久不差多變嘔噦及為濕蠱

出第十  
七卷中

崔氏療痢血數十年方 石灰三大升 右一味以水一斗攪令澄清一服一升三服止出第三

小品療下血連歲不愈方 黃連半斤 右一味搗末以雞子白和為餅子微火炙令黃黑復搗篩服方寸

匕日三有效下消血瘕黃芩色醫不能療者皆差附後

文仲治七八十老人患積痢不斷兼不能飲食方 人參四分 鹿角去皮取白作末炒令黃 右二味搗篩為散平旦

以粥清服方寸匕日再並出第三

蟲注痢方三首

病源此由歲時寒暑不調則有濕毒之氣傷人隨經脈血氣漸至於臟腑大腸虛者毒氣乘之毒氣挾熱與血相搏則成血痢也毒氣侵食於臟腑如病蠱注之狀痢血離膿瘰黑有片如雞肝與血離下是也出第十

卷中

肘後療苦時歲蠱注毒下者方 礬石熟二兩 乾薑 附子炮 黃連各二兩 右四味搗篩為散以酒服方寸

匕日三不止更服

又方 黃連 黃柏各半斤 右二味搗末蜜丸如梧子大飲服十九日四服並出第二

古今錄驗療純痢血如鵝鴨肝并協蠱毒方 茜根 升麻 犀角 桔梗 黃柏 黃芩各三兩 地榆

藥荷根各四兩

右八味切以酒三升漬一伏時服一升日一服千金同未差更作出第六卷中



腸蠱痢方一首

病源腸蠱痢者冷熱之氣入在腸間先下赤後下白連年不愈侵傷於臟腑下血雜白如病蠱之狀名為

腸蠱也

出第十卷中

肘後凡病下應先下白後下赤若先下赤後下白為腸蠱方 牛膝三兩搗碎以酒一升漬經宿每服一

兩杯日二三服姚同

出第二卷中

膿血痢方七首

病源夫春陽氣在表人運動勞役腠理則開血氣虛者傷於風至夏又熱氣乘之血性得熱則流散也其遇大腸虛而血滲入焉與腸間津液相搏積熱蘊結血化為膿腸虛則泄故成膿血痢也所以夏月多苦膿血痢者腸胃虛也秋冬診其脾脈微濇者為內潰多下血膿又脈澀絕則死滑大則生脈微小者生實急者死脈沉細虛遲者生數疾大而有熱者死

出第十卷中

肘後療熱病久下痢膿血柏皮湯方 黃柏三梔子二十黃連兩阿膠兩 右四味切以水六升煮取

二升分為三服又一方加烏梅二十枚

文仲同出第二卷中

文仲治熱痢及下黃赤水及黃膿血四肢煩皮上冷者方 黃連兩熟艾兩黃柏兩黃芩兩 右四味搗

篩為末以黃臘二兩安一升蜜中煮令消及煖和藥白飲服六七十九如小豆日二夜一即驗

又久下痢膿血方 赤石脂升烏梅二十乾薑片粳米升 右四味切以水七升煮取令熟藥成服七合

日三

肘後同並出第三卷中

刪繁瘰下焦熱或痢下膿血赤石脂湯方 赤石脂兩烏梅二十梔子十四白朮蜀椒汁麻各三乾

薑二兩粟米升右八味切以水一斗二升煮米熟去滓取七升下諸藥煮取五合服之

出第四卷中

備急葛氏云若挾熱者多下赤膿雖血方 黃連 竈突中塵兩 右二味末之酒服方寸匕日三服

肘後云以東膏和分作三丸日服一丸姚氏同出第六卷中

病本一作痢

同字下宋本有忌猪肉冷水五字尚德接臟疑當作蠱

麻字上宋本有升字之字下宋李在肉五字同字下宋本有忌猪



肉冷水五  
字  
數字下宋  
本有忌豬  
肉冷水生  
葱七字

服宋本作  
肘

再字下宋  
本有忌海  
藻菜豬  
肉冷水九  
再字下宋  
本有忌生  
冷滑豬肉  
冷水八字  
服字下宋  
本有忌豬  
肉冷水五

古今錄驗療腸澼瀉便膿血乾薑散方 乾薑 黃連 桂心各一 右三味搗篩服方寸匕著麝中食

日三多膿加薑多血加桂有驗

又療中寒下痢膿血附子散方 蜀附子炮 一枚 麴 乾薑各三 右三味下搗篩為散先食以酒服方寸

匕日二并療婦人漏下忌如前 並出第 三卷中

赤白痢方六首

病源凡痢皆由榮衛不足腸胃虛弱冷熱之氣乘虛而入容於腸間腸虛則泄故為痢也然其痢而赤白

者是熱乘於血血滲腸內則赤也冷氣入腸搏於腸間津液凝滯則白也冷熱相交故赤白相雜重者狀

如膿涕而血雜之輕者白膿上有赤脈薄血狀如魚腦世謂之魚腦痢也 出第 十卷中

文仲鹿茸散治青黃白黑魚腦痢日五十行方 鹿茸 一分 石榴皮 二兩 乾薑 八兩 棗核中人 七枚 赤地利 燒作

反服後云赤 右五味搗篩為散先食飲服方寸匕日三夜一若下數者可五六服 附後

小品卒久赤白下方 燒馬屎 一九作灰分服酒水隨意服已試良 附後

深師療赤白下者黃連湯方 黃連 黃柏 乾薑 石榴皮 阿膠 各兩 甘草 一兩 右六味切以水

七升煮取二升為三服日再 出第 二十卷中

延年駐車丸主赤白冷熱痢腹痛方 黃連 六兩 乾薑 二兩 當歸 三兩 阿膠 炙 三兩 右四味搗篩三年酢八合消

膠令鎔和併手丸如大豆以飲服三十九日再 附後 同出 第 七卷中

救急療赤白痢無問新舊入口即斷方 香豉 心 好 不是 去皮 取 心 勿 浪 用 之 且 右一味以取豉搏令

乾香搏為末壯年者一大升豉心為四服小兒量與之 出第 九卷中

必效主赤白痢方 黃連 二兩 阿膠 四兩 右二味以好酒二大升合黃連煎十五沸澆出滓然後內膠令烱

溫分三服 出第 二卷中

久赤白痢方四首

赤白痢方六首 久赤白痢方四首



尚德按月  
病源作戶  
宋本同

荆字下宋  
本有臂許  
大者四小

部字下宋  
本有中宇

差字下宋  
本有忌海  
藻按宋五

字  
通按山榆  
人疑誤

尚得按字  
時珍本草  
榆下時珍  
日山榆之  
英名無莢  
宋本協作

病源久赤白痢者是冷熱乘於血血滲腸間與津液相雜而下甚者腸虛不復故赤白連滯久不差也凡痢久不差脾胃虛弱則變嘔噦胃弱氣逆故嘔也氣逆而外有冷折之不通故噦亦變為蠱蟲食人五臟也三月九蟲常居人腸胃腸胃虛則動上食於五臟則心懊懣而悶齒斷唇口並生瘡下食於腸則肛門傷爛而穀道開也輕者可治重者致死

出第十卷中

崔氏馬蘭子散療赤白痢腹內疝痛并久水穀痢色白如泔澱悉主之極重者不過三四日必差方

蘭子散一升地榆根皮八分厚朴八分熟艾八分赤石脂半斤龍骨分茯苓分當歸分右八味搗篩為散一

服方寸匕加至四五匕日再夜一白飲服

出第三卷中

文仲療赤白痢五六年者方 燒大荆 右一味取漚服五六合即差

附後

又卒腹痛下赤白數日不絕方 雞子一枚和頭胡粉末令滿燒 右二味以酒服之

附後同並出第三卷中

近效療赤白痢日數十行無問老小方 甘草二兩 右一味切以漿水四升煮取一升去滓頓服之

疳痢方六首

必效療冷疳痢方 取真岩子熟 右一味搗為末和臘月猪脂更搗令熟為丸綿裹如棗許大以內

下部因痢出即更內新者不過三度即差

出第二卷中

古今錄驗療五疳蒸下痢方 苦參三兩 青柏 甘草三兩 右三味切以水四升煮取二升半分三灌即

愈凡蒸但服生地黃汁即差

又方 青黛 丁香 黃連各等 右三味搗篩用泔澱和為丸口中有瘡含之若下部有瘡以綿裹內

下部日服五六十九含之令下差

又方 丁香 麝香研石黛 石鹽 山榆人 小柏皮 桂心 蔓薑 青礬石燒頭髮灰 右十味

搗為散著瘡上乾者和臘月猪膏煖著瘡時行病後食羊肉及肥膩或酒或房而得久蒸絡變為疳必

須攻下部不可輕之



終輕字下  
有忌生葱  
三字無之

中字下宋  
本有忌生  
葱裡肉五

二日服下  
宋本有亦  
得忌生冷

醉滑豬肉  
魚三日內  
不得食菜

十七字

下字下宋  
本有亦得

越諸魚羹  
筍炙肉生

葱蒜酢冷  
水十九字

服字下宋  
本有忌猪

魚蒜冷水  
六字

風字下宋  
本有日字

通按數字  
疑誤

者佳宋本  
作唯佳

升字下宋  
本有淨鐵

懷三字

又療疳濕痢方 青箱 雄黃<sup>研</sup> 石硫黃<sup>研</sup> 蕪荑 雷丸<sup>各二兩</sup> 苦參 狼牙<sup>各三兩</sup> 藜蘆<sup>一兩</sup> 右八味搗

歸為散取如杏人大內下部中

又療疳濕痢神效方 黃連<sup>兩</sup> 零陵香<sup>半兩</sup> 犀角<sup>一兩</sup> 丁香<sup>三十粒</sup> 麝香<sup>一大豆</sup> 牛黃<sup>一大豆</sup> 右六味以水洗

黃連零陵香丁香澄取清水去滓更以水添滿九升內黃連零陵香犀角煮兩沸然後著牛黃麝香

煎一沸取一升分作三服如一日服不盡二日服<sup>又深師以九升先以一分煮添盡九升</sup>

久疳痢及久痢成疳方九首

廣濟療久患疳痢不差凡子礬散方 元子礬<sup>八分</sup> 麝香<sup>二分</sup> 吳白礬<sup>六分</sup> 雲母粉<sup>五分</sup> 桂心<sup>二分</sup> 龍骨<sup>六分</sup> 無

食子<sup>燒</sup> 黃連<sup>八分</sup> 右八味搗歸為散空腹以生薑汁和生薑汁和三錢匕服日再煮薑湯下

又療積年疳痢羸瘦面色痿黃方 石硫黃<sup>研</sup> 黃連<sup>一兩</sup> 艾<sup>一兩</sup> 蜜升 右四味以水二升先煮黃連艾取

半升後內石硫黃末更煮三五沸即絞去滓又內蜜更煮三五沸下分為三服<sup>並出第</sup>

必效療積久痢成疳灌方 檮根<sup>一握</sup> 淨洗剝白皮搗取 麻子脂<sup>二合</sup> 燒酢泔<sup>二合</sup> 合椒<sup>四分</sup> 豉<sup>二分</sup> 右

五味以水六升取椒豉和煎絞取汁二升和檮汁麻油泔淀等三味分為兩分用一分罐隔一日更取

餘者復濯其藥欲用時溫溫即得<sup>得字下宋本有忌酒肉油麵雞豬魚蟹唯食煮飯葱白爛煮</sup>

又療痢初較後膿血或變純白或成魚腦五十日以上或一二年不差變成疳所下如泔淀方 生羊肝

一具 右一味取大酢一年以上者米麥並中年深者佳取羊肝則去上膜柳葉切朝旦空腹取肝手

拈取酢中出吞之覺心悶則止不悶還服之一日之間能不食粥飯盡一具羊肝者大佳不然除飽吞

已外料理如生肝以薑薑下飯如常法食之日食一具肝不過二三具即永差後一月不得食熱麵油

膩醬猪肉雞肉等

又療疳痢久不差羸瘦著牀欲死方 新出羊糞<sup>升</sup> 右一味以水一升漬經宿明旦絞汁頓服之極重



又療瘡法丈夫婦人小兒久痢百方療不能差此方最效 丁香 麝香 黃連各等 右三味搗篩為

散以杏核大取竹筒吹入下部小兒取核子量力減之不過三四迴差積年久瘡痢不差蔡光州云常

用奇效 備急同並 第三卷中

又療久痢變成瘡下部竅生惡瘡惡寒壯熱者方 桃白皮切 槐白皮切 升苦參切 艾 大棗切 右

五味以水五升煮取二升半去滓內熊膽棗許大攪令勻取二升灌下部餘三分服

近效新附瘡久痢及瘡痢諸方不差者此方必效 陳檣根白皮不拘多少當取時 右一味細切搗如

泥取細麴捻作餛飩如小棗勿令破熟煮吞七枚重者不過七八服皆空腹服之

又瘡痢曉夜無度者方 取檣根濃汁一雞子 右一味切以粟米泔一雞子殼許灌下部再度即差其

驗若神小孩兒減半用之 醫人指 藥錄上

數十年痢方一十一首

千金療下痢九主數十年痢下下氣消穀令人能食夏月長時服之令人不霍亂方 黃連 黃柏 桂

心 大麥藥一升 乾薑藥三 吳茱萸藥四 蜀椒藥二 麴藥一 烏梅藥二 右九味搗篩蜜和食已飲服如

梧子十九日三服至二十九亦可至三十九 肉冷水生葱等八字

又療數十年下痢消穀下氣補羸烏梅肉九方 麴升炒 附子炮二 大麥藥一 當歸三 桂心三 黃連

吳茱萸 烏梅肉 乾薑藥四 蜀椒藥二 右十味搗篩蜜和九如梧子食已飲服十九日三

又四續九主三十年疰痢骨立萎黃腸滑不療方 雲實五兩 白蠟五兩 附子炮二 女萎三 龍骨二 右五味

搗篩為末以蠟煎烱以丸藥如梧子飲服五九日三不過五六服必差其雲實熬令香千金名臘煎丸

忌豬肉冷 水等六字

又療三十年下痢所食之物皆不消化或青或黃四肢沉重起即眩倒骨肉消盡兩足逆冷腹中熱苦轉

筋起止須人扶陰冷無子椒艾丸方 赤石脂二兩 熟艾升 乾薑三 蜀椒三 烏梅三 右五味

尚德按並 出字 文字下宋 本有三月 三日者五 合熟八小 字 服之下宋 本有忌酒 賦熱麵五 字 尚德按將 千金作將 又按大麥 藥一升半 六字疑當 在乾薑各 三兩下十 金黃連黃 柏桂心乾 薑各三兩 大麥藥一 升烏梅三 升半 尚德按干 金當歸桂 心各二兩 服二十九 日三下宋 本有忌宿



肉冷水主  
 葱等八字  
 尚德按二  
 金女萎二  
 兩龍背三  
 兩有白木  
 二兩半臘  
 作蠟  
 尚德按十  
 金烏梅二  
 百枚椒薑  
 艾下歸梅  
 若一斗米  
 下煮  
 又按千金  
 不加艾  
 服字下宋  
 肉有忌猶  
 肉冷水五  
 斗千金作  
 尚德按二  
 一斗  
 良字下宋  
 本有忌桃  
 李崔肉生  
 葱猪肉冷  
 水海藻菰  
 菜十五字  
 度字下宋  
 本有忌豬  
 肉冷水兩  
 物等八字

先搗篩薑椒為末將熟艾梅肉若一斛酒飯下煮令飯熟內乾薑椒末赤石脂末合搗三千杵蜜和丸  
 如梧子飲服十九日三不差至二十九加黃連一升艾一斤斤冷水下宋本有忌豬

又療三十年痢不止方 厚朴炙乾薑 阿膠炙黃連五兩石榴皮 艾葉各三兩 右六味切以水七升

煮取二升分再服

又療積久三十年常下神效方 赤菰木皮去上蒼 右一味為散麵粥和一升服之日三即止不過服

一斗永差秘方三十年痢百日服差良並出第十卷中 右一味為散麵粥和一升服之日三即止不過服

古今錄驗療三十年寒下及霍亂諸藥所不能療并腸滑若是蠱症所中 方 蓼子 艾屑各一升 龍膽

續斷 白朮各三兩 蜀椒汗附子 炮桂心 苦參 乾薑 甘草炙鼠尾草 右十二味搗篩蜜和

一歲兒服一丸如梧子三歲兒服二丸五歲兒服三丸大人服五丸飲下瘧寒熱氣幅幅在胸中卒氣

痛繞臍神良

療丘公療下痢三十年方 茯苓 乾薑 黃連等 右三味搗篩為散蜜和丸如梧子飲服之一日漸

增至百丸若痢劇者加龍骨附子炮等分一服十九丸漸增之以知為度

又當歸湯療三十年下痢止諸痛方 當歸一兩生薑八兩大棗二十枚 右三味以水四升煮取一升半分作

三服不差復作之

又云吾患痢三十餘年諸療無效唯服此方得愈也安石榴湯療大症痢及白帶因篤欲死腸已滑醫所

不能療方 乾薑二兩生黃柏一兩石榴一枚阿膠二兩 右四味切以水三升煮取一升二合去

滓內膠令烊頓服不差復作療老小亦良人羸者稍稍服之不必頓盡須更復服石榴須預取之附微

竝無黃柏用黃連

又療師療久痢方 龍骨 赤石脂 無食子各六兩地榆三兩熟艾三兩諸橡子 黃柏各五兩 右七味搗

篩蜜和丸如梧子空腹飲服四十五十九日二服稍加至六十丸



休息痢方五首

病源休息痢者胃管有停飲因痢積久或冷氣或熱氣乘之氣動於飲則飲動而腸虛受之故為痢也冷熱氣調其飲則靜而痢亦休也腸胃虛弱易為冷熱其邪氣或動或靜故其痢乍發乍止謂之休息痢也

出第十卷中

肘後療休息痢方 黃連切龍骨如鴨子膠如掌大炙熟艾炷 右四味水五升煮三物取二升去滓乃內膠

膠烱分再服濃煮乾艾葉亦佳又當煮忍冬米和作飲飲之

又方 乾地榆斤附子炮 右二味以酒一斗漬五宿飲一升日三服盡更作

又方 龍骨四兩 右一味搗如小豆以水五升煮取二升半冷之分為五服又以米飲和為九服十九飯

同並出第卷中

文仲葛氏若久下經時不愈者此名為休息下療之方 取大骨尚德按大疑當作天千金狗頭燒反療小兒久痢 右一味炙

令黃焦搗篩飲服方寸匕日三愈肘後備急同

胡洽麴藥丸療數十年休息痢下不能食消穀下氣療虛羸方 麥藥炒麴一升 附子炮桂心 烏梅肉

各二人參從各四兩 右七味搗篩蜜和為丸如梧子食前飲服十九日三稍稍增之肘後備急同出第三卷市

腹肚不調痢一首尚德按痢字下疑服方字

廣濟療冷熱不調痢膿水方 人參 乾薑 枳實炙各厚朴炙 龍骨 赤石脂 黃連 苦參各六黃

分五 右九味搗篩蜜丸空腹以飲服如大豆十五丸日二漸加出第三卷中

洩痢不禁不斷及日數十行方三首

集驗結腸丸療熱毒下不斷不問久新悉療之方 苦參 橘皮 獨活 阿膠炙芍藥 乾薑 黃柏

甘草 炙鬼白各四兩 右九味搗篩蜜與膠共烱以和丸餅手捻作丸如梧子暴燥以飲服十九日三不

知稍加此方亦療諸症下及卒下悉效

之字下宋本有忌猪肉冷水五字 作字下宋本有忌猪肉冷水五字 通按前有不骨反此云大骨前下何骨前云牛骨亦得或者猪牛皆可 物字上宋本有七月之字下宋本有忌猪肉冷水五字 葱大酢九字 加字下宋本有服者亦得四字



裨宋本作建

之字下宋

本有忌猪

肉冷水生

慈酢八字

痢字下宋

本有忌猪

肉范江同

六字

服字下宋

本有忌海

藻菰菜蕪

羹七字

高德接笑

疑當作各

服字下宋

本有忌猪

肉海藻菰

菜生忌蕪

羹十一字

良字下宋

本有忌海

藻菰菜蕪

肉冷水九

字

之字下宋

本有忌猪

半狸肉隔

又裨脾丸療脾胃虛弱洩下不禁飲食不消雷鳴絞痛方 附子地一兩 蜀椒汗一兩 桂心酢一兩 赤石脂 黃

連 人參 乾薑 茯苓 大麥蘖 陳麴炒 石斛 當歸各二兩 鍾乳研三兩 右十三味搗篩蜜和以

酒服十九如梧子日三稍稍加之出第四卷中

文仲療五勞及飽食房室傷胃令人大便秘數至瀉而不能便日數十行劇者下血并婦人產後餘疾腹絞

痛方 附子地一兩 右一味以豬脂如雞子黃大煎附子裂為候削去上黑皮搗篩和丸先食服如大豆

三九日三稍加可至十九當長服之永不痢出第三卷中

下焦虛寒及遠血並血方二首

崔氏療下焦虛損或先見血後便此為遠血或痢不痢伏龍肝湯方 伏龍肝研五合 甘草一兩 乾地黄五兩

燒髮灰合二兩 黃芩 牛膝 乾薑 生櫛皮 阿膠各二兩 右九味切以水七升煮七物取三升去滓

下阿膠更煎取滓乃下髮分作三服

又療下焦虛寒損或前便轉後見血此為近血或痢下或不痢好因勞冷而發續斷湯方 續斷 當歸

桔梗 阿膠炙 桂心炙 乾薑 乾地黄 芎藭各四兩 蒲黃升 甘草二兩 右十味切以水九升煮八

物取三升五合去滓下阿膠更烱膠取沸下蒲黃分為三服出第四卷中

下痢食完出及上八下出方一首

范汪溫中湯療寒下食完出方 甘草炙 乾薑各三兩 蜀椒八十粒 附子地一兩 右四味切以水二升煮取一

升分為再服若嘔內橘皮半兩小與老皆取服之良出第十卷中

下痢腸滑方三首

范汪苦酒白丸療赤白滯下腸已滑日數十行者方 女萎 半夏洗 附子炮 藜蘆各一兩 右四味

搗合下篩和以十年苦酒頓丸如梧子若有下者飲服三九日三不知稍稍增之出第十卷中

集驗療下痢腸滑飲食及服藥皆完出豬肝丸方 豬肝一斤 煮黃連 阿膠炙 烏梅肉各二兩 胡粉七

下焦虛寒及遠血並血方二首 下痢食完出及上八下出方一首



本有忌猪

肉三子

金以清酒

一斗煮無

加字

之字下米

有忌猪肉

冷水菰菜

海藻九字

尚德按復

疑當作腹

驗字下宋

本有忌猪

肉冷水五

尚德按益

病源作益

尚德按李

時珍本草

烏梅下引

此方作烏

梅二十個

又按者字

疑衍

右五味擣下篩蜜和酒服十五丸如梧子日三稍加亦可散服葛氏大仲胡治同附後云

千金瘡下痢絞痛腸滑不可差方 黃連六兩阿膠 鼠尾草 當歸 乾薑略三 右五味切以酒七升

煮取三升去滓溫分三服若熱不絞痛去乾薑加當歸以水煮之出第十卷中

大注痢及赤白因馬腸滑方二首

深師卒大注痢及赤白滯下困篤欲死腸已滑方 乾薑二兩生 黃柏 石榴皮各一兩 附膠二兩 淡豉升

前胡四兩 右六味切以水三升煮取三合去滓內膠頓服不差更作無毒宜老小羸人稍稍服之此湯

兼瘡傷寒大下及赤白困篤亦皆主之出第二十卷中

范汪瘡得病羸劣服藥不愈因作腸滑下痢膿血日數十行復中絞痛身熱如火頭痛如破其脈如瀉方

黃連四兩 苦參四兩 阿膠一兩 右三味以水一斗煮取二升去滓適寒溫服二合日三少少益至半升

服湯盡者復合以愈為度曾試驗古令錄

痢兼渴方二首

病源大水穀之精化為血氣津液以養臟腑臟腑虛受風邪邪入於腸胃故痢痢則津液空竭臟腑虛燥

故痢而兼渴也渴而引飲即痢不止翻溢水氣脾胃已虛不能剋消水水氣流溢浸漬肌肉則變成腫也

出第十卷中

必效瘡痢兼渴方 麥門冬三兩 烏梅一枚 大 右二味以水一大升者煮取強半絞去滓待冷細咽之

即定仍含之出第二卷中

古今錄驗瘡熱渴痢方 冬瓜一枚 右一味以黃土厚一尺火炮穩約以水爛去土淨洗絞取服之

許仁則痢方七首

許仁則云此病有數種有水痢有穀痢有血痢有膿痢有膿血相和痢者有腸辟痢其水痢者本由脾氣

熱消穀作水穀氣不得消便生此痢穀痢者由脾氣冷穀氣不消而生此痢血痢者由毒熱在腹血流入

毒米本作



尚穩按伏  
疑當作狀

止字下宋

本有忌猪  
肉冷水五

尚德按過  
疑當作過

良字下宋

本有忌猪  
肉冷水五

肉冷水五  
茶桃李在

肉等十二  
字

候字下宋

本有二物  
正等四字

無食字

良字下宋

本有忌生

腸致有此痢膿痢者由積冷所致膿血相和痢者由冷熱相擊便致此痢腸澼痢者由積冷在腸腸間垢

涕不能自固便有此痢色數雖多其源則一皆緣飲食不節將息失宜也

又水痢之候心腹甚痛食無妨但食後即痢食皆化盡唯變作水穀無期度多食多下少食少下有此伏

者宜依後黃芩等五味散服之方 黃芩 黃連 黃柏各五兩 黃耆四兩 龍骨六兩 右藥搗篩為散以飲下

之初服一方寸匕日二服稍稍加至二三匕服差乃止

又穀痢之候痢無期度食不消化腹痛每過冷便發有此疾候者宜依後附子等五味散主之方 附子

炮細半 白朮各五兩 乾薑四兩 神麴升 右藥搗篩為散以飲下之初服一方寸匕日再服稍稍加至二

三匕良

又血痢之候小腹絞痛無期度食不住如水但氣血而下有此患者宜依後方宋本無

犀角五味散方 生犀角末五兩 阿膠炙四兩 黃柏四兩 艾葉 乾薑各三兩 右藥搗篩為散以飲下之初

服一方寸匕日再服稍稍加至二三匕良

又膿痢之候腹亦刺痛食亦不大稀但大便兼膿過冷而劇有此候者宜依後神麴等五味散服之良

麴末升 乾薑六兩 丁香 豆蔻各四兩 高良薑五兩 右藥搗篩為散以飲下之初服一方寸匕日再服稍稍

加至二三匕良

又膿血相和痢候食不甚稀每出膿血與食相兼腹亦小痛有此候者宜依後黃耆等五味散服之方

黃耆六兩 赤石脂八兩 厚朴五兩 乾薑 艾葉各三兩 右藥搗篩為散以飲下之初服一方寸匕日再服稍

稍加至二三匕良

又腸澼痢候食稀或稠便但似膿每便極滑痢有常期有如此者宜依後豆蔻子等八味散服之方 豆

蔻子 丁香各三兩 細辛 附子 乾薑各四兩 人參 黃耆各五兩 赤石脂六兩 右藥搗篩為散以飲下之




葱猪肉冷  
水七字

中字下末  
本有忌生  
菜桃李在  
同等吳昇  
同十一字

又前件諸痢患無新舊如藥療之費差遠發此即繼以新藥止之終存其根本由腸胃中冷熱不調病根  
固結必須湯藥滌之以洩病勢痢後更以藥物補助之有此候者宜依後附子等六味湯以利之後服高  
良薑十味散以補之方 附子炮細辛 甘草炙人參 乾薑兩三 大黃兩五 右藥切以水七升煮取二  
升四合去滓分溫三服如人行十里久一服此湯當得快利利中有惡物如魚腦狀或如桃李但異於  
常利勿怪之將息經三四日宜合後高良薑等十味散服之方 高良薑 細辛 黃耆 白朮 苦  
參 芍藥 丁香 人參 乾薑兩四 豆蔻子三 赤石脂兩六 右藥搗篩為散以飲下之初服一方寸匕日  
再服之稍稍加至二三匕並出上  
卷中







W2467 W

1915

V. 23-25